



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *MARACAS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. A1-563  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127) ir *Maracas* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Maracas*, Adama Registrations B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 50 g/l + prochlorazas 225 g/l

Fungicido forma: koncentruota emulsija

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra propano rūgšties 2-hidroksi–2-etilheksilesterio. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistemas.

Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).

Inžinerinės kontrolės priemonės gali pakeisti asmens apsaugos priemonės, jeigu jos užtikrina lygiavertę arba didesnę apsaugą.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniam kviečiam.

Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30 – 59) 2 kartus po 1,0 l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Apsaugai nuo stiebalūžės purkšti 2,0 l/ha BBCH30-32. Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha.

Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

Žieminiam ir vasariniam miežiui.

Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios ir rudadėmės dryžligės, rinchosporiozės, miltligės, smulkiųjų rūdžių, miežių septoriozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0 l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha.

Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

Žieminiam ir vasariniam kvietrugiam.

Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30 – 59) 2 kartus po 1,0 l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha.

Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms..

#### Rugiams

Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.

Saugo nuo rinchosporiozės, miltligės, rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0 l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha.

Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

#### Avižoms

Norma: 1,0 – 2,0 l/ha.

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, avižų dryžligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0 l/ha, arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha.

Pastaba: Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas