



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. SPALIO 17 D. ĮSAKIMO NR. A1-216 „DĖL
FUNGICIDO *PREVICUR ENERGY* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM IR
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. spalio 11 d. Nr. A1-563
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. A1-216 „Dėl fungicido *Previcur Energy* įregistravimo profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *PREVICUR ENERGY* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM IR NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), Konsultavimo komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdama į *Previcur Energy* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas bei SIA Bayer 2018 m. rugsėjo 5 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Previcur Energy*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.
 - 1.1. Veikliosios medžiagos – propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l.
 - 1.2. Fungicido forma – tirpus koncentratas.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazę – Gali sukelti alerginę odos reakciją.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Substrato daržovėms, dekoratyviniams augalams auginti šiltnamiuose dezinfekcijai.

Naudojamas 1,25 proc. tirpalas (250 ml/20 l vandens 1 m³ substrato).

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų (*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phoma* spp., *Phytophthora* spp., *Alternaria* spp.).

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolinių kopūstų, briuselinių kopūstų, salotų daigams.

Daigai laistomi 0,15 proc. tirpalu (15 ml/10 l vandens).

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Agurkams, pomidorams, paprikai, auginamiems šiltnamiuose.

Norma – 3,0 l/ha arba 30 ml/100 m².

Laistoma lašeline drėkinimo sistema natūraliame substrate.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 3 dienoms.

Agurkams, pomidorams, paprikai, auginamiems šiltnamiuose.

Norma – 3,0 l/ha arba 30 ml/100 m².

Laistoma lašeline drėkinimo sistema mineraliniame substrate.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, paskutinį kartą ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 3 dienoms.

Dekoratyviniams augalams.

Naudojamas 0,2 proc. tirpalas (20 ml/10 l vandens).

Saugo nuo fitoftorozės, pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.

Norma – 2,5 l/ha arba 25 ml/100 m².

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Peronospora* spp., *Bremia* spp.).

Purškama vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

2. Įregistruoju fungicidą *Previcur Energy*, Bayer AG, neprofesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

2.1. Veikliosios medžiagos – propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l.

2.2. Fungicido forma – tirpus koncentratas.

2.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį

Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

2.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

2.3.2. Pavojingumo frazę – Gali sukelti alerginę odos reakciją.

2.3.3. Atsargumo frazes:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

2.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

2.4. Pakuotės: 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml.

2.5. Fungicidas naudojamas substrato daržovėms, dekoratyviniams augalams auginti šiltnamiuose dezinfekcijai.

Naudojamas 1,25 proc. tirpalas (2,5 ml/200 ml vandens) sulaistyti 10 l substrato laistytuvu su smulkių skylučių tinkleliu ir išmaišyti.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolinių, briuselinių kopūstų, salotų daigams.

Laistoma 0,15 proc. tirpalu (15 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m²).

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.

Naudojamas 0,2 proc. tirpalas (20 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m²).

Saugo nuo fitoftorozės, pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.

Norma – 25 ml/100 m².

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Peronospora* spp., *Bremia* spp.).

Purškiama vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė