



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO AZOCIP ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. lapkričio 3 d. Nr. A1-573  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į Sharda Cropchem España, S.L. 2017 m. rugsėjo 20 d. paraišką:

1. Įregistruoju fungicidą *Azocip*, Sharda Europe b.v.b.a, profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: azoksistrobinas 200 g/l + ciprokonazolas 80 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksminga prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jei poveikis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, lapų septoriozės.

Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, lapų septoriozės.

Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių

Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis