



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. KOVO
20 D. ĮSAKYMO NR. A1-76 „DĖL HERBICIDO *GLYFOS 360 SL* PERREGISTRAVIMO,
NAUDOJIMO REGLAMENTO KEITIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI IR
ĮREGISTRAVIMO INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. rugpjūčio 11 d. Nr. A1-573
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. A1-76 „Dėl herbicido *Glyfos 360 SL* perregistravimo, naudojimo reglamento keitimo profesionaliam naudojimui ir įregistravimo individualiam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *GLYFOS 360 SL* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI IR ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. lapkričio 29 d. protokole Nr. 6, 2005 m. gruodžio 20 d. protokole Nr. 7, ir 2006 m. kovo 15 d. protokole Nr. 2 ir 2010 m. rugsėjo 14 d. protokole Nr. AS-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Glyfos 360 SL* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Glyfos 360 SL*, Cheminova A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l

Herbicido forma: vandens tirpalas

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus .

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą .

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l, 1000 l.

Pastaba: 1000 l pakuotės skirtos tik profesionaliems naudotojams, naudojantiems didelius šių herbicidų kiekius.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams ir miežiams.

Norma: 3 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams kviečių ir miežių pasėliams.

Žirniams.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75 proc. ankščių, ne daugiau kaip vieną kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams.

Lubinams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75 proc. ankščių, ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių lubinų pasėliams.

Linams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių linų pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams.

Pūdymams, dirvonams.

Norma: 3,0–5,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Plotams, skirtiems žemės ūkio augalams sėti ir sodinti.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 3,0–5,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 3,0–5,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje viržiams naikinti.

Norma: 4,0–6,0 l/ha.

Mažesnę normą naudoti viržiams naikinti iš daug organinių medžiagų turinčios dirvos, didesnę – iš daug mineralinių medžiagų turinčios dirvos.

Purkšti antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui antžemine aparatūra ne daugiau kaip 1 kartą.

Minkštųjų lapuočių kelmams.

Norma: 1 dalis *Glyfos 360 SL* ir 4 dalys vandens (1:4).

Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmus tuoj pat aptepti ar apipurkšti.

2. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Glyfos 360 SL*, Cheminova A/S neprofesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l

Herbicido forma: vandens tirpalas

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l.

Herbicidas naudojamas:

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles pavasarį, vasarą arba rudenį ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių.

Plotams, skirtiems vaismedžiams ir uogynams veisti.

Norma: 150–200 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles, kai jos turi 3–4 lapus arba yra iki 10–12 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Plotams, skirtiems kitų metų augalams auginti.

Norma: 150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės stadijos, ne daugiau kaip 1 kartą.

Plotams prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją.

Norma: 120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos, 5 dienos prieš sėją ar sodinimą ne daugiau 1 vieną kartą.

Gėlynams, vejoms.

Norma: 1 dalis *Glyfos 360 SL* ir 3 dalys vandens (1:3).

Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas