



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-19 „DĖL
FUNGICIDO *BARCLAY BOLT XL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. spalio 19 d. Nr. A1- 578
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. A1-19 „Dėl fungicido *Barclay Bolt XL* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *BARCLAY BOLT XL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), *Barclay Bolt XL* registracijos ataskaitos išvadamis ir atsižvelgdamas į *Barclay Bolt XL* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas ir 2016 m. rugsėjo 28 d. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. prašymą,

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Barclay Bolt XL*, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. sausio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: propikonazolas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas prarijus.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džūvimą arba skilinėjimą.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 5 l

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, varpų juodligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo smulkiųjų ir geltonųjų rūdžių, varpų juodligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Avižoms.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, varpų juodligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, varpų juodligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Varpinėms žolėms.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki šienavimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Varpinėms žolėms, sėklai.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu sėklų nuėmimo metais ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo baltulių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas