



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *CABRIO DUO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. A1-601
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Cabrio Duo* registracijos ataskaitos išvadamis:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Cabrio Duo*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. sausio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: dimetomorfis 72 g/l + piraklostrobinas 40 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Dirgina odą.

Kenksminga prarijus ar įkvėpus.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 0,15 l; 0,25 l; 0,5 l; 1,0 l; 3,0 l; 5,0 l; 10,0 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Svogūnams, česnakams, „shallot“ tipo svogūnams.

Norma: 2,0 – 2,5 l/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti nuo 3 lapelių tarpsnio iki kol pusės augalų lapų nulinkę (BBCH 13 – 48), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Agurkams, cukinijoms, patisonams, aguročiams.

Norma: 2,0 – 2,5 l/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti nuo pirmo tikrojo lapelio tarpsnio iki kol visi vaisiai turi būdingą subrendusio vaisiaus spalvą (BBCH 11 – 89), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 1 dienai.

Salotoms.

Norma: 2,0 – 2,5 l/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti nuo skilčialapių tarpsnio iki kol pasiekiamas tipinis dydis, forma ir tvirtumas (BBCH 10 – 49), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas