



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M.
GRUODŽIO 16 D. ĮSAKymo NR. A1-244 „DĖL FUNGICIDO *FANDANGO*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. A1- 602
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-244 „Dėl fungicido *Fandango* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *FANDANGO* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Fandango* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. Bayer Crop Science AG prašymą:

1. A t n a u j i n u fungicido *Fandango*, Bayer Crop Science AG, registraciją profesionaliajam naudojimui.

1.1. Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 100 g/l + fluoksastrobinas 100 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 2-[2-(1-chlorciklopropil)-2-hidroksi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 50 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, dalinai nuo stiebalūžės ir varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, rudadėmės dryžligės, ramuliarijos, rūdžių, rinchosporiozės, dalinai nuo stiebalūžės ir varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas