



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMŲ NR. A1-277 „DĖL
FUNGICIDO *ALIETTE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2017 m. gruodžio 5 d. Nr. A1-636
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, atsižvelgdamas į Bayer 2017 m. lapkričio 9 d. prašymą ir *Aliette* registracijos ataskaitos išvadas:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. A1-277 „Dėl fungicido *Aliette* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Fungicidas naudojamas:

Pirmametėms braškėms (pagal EP ir ET Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,2–0,3 proc.

Saugo nuo braškių šaknų šerdies raudonligės (*Phytophthora fragariae*).

Sodinukų šaknis tirpale mirkyti 15–30 min. prieš sodinimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Pirmametėms braškėms (pagal EP ir ET Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 4,0 kg/ha.

Saugo nuo braškių šaknų šerdies raudonligės (*Phytophthora fragariae*).

Purkšti praėjus 4 savaitėms po pasodinimo.

Saugo nuo braškių vytulio ir uogų odiškojo puvinio (*Phytophthora cactorum*).

Purkšti praėjus 2–3 savaitėms po sodinimo, kai augalai gerai įsišaknija, purškimą kartoti po 20–30 dienų. Jei pastebimas užkratas trečią kartą purkšti rudenį (rugsėjo pradžioje ar anksčiau).

Pirmametės braškes purkšti ne daugiau kaip 3 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Antrametėms ir trečiametėms braškėms (pagal EP ir ET Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 4,0 kg/ha.

Saugo nuo braškių šaknų šerdies raudonligės (*Phytophthora fragariae*).

Purkšti pavasarį prasidėjus vegetacijai.

Saugo nuo braškių vytulio ir uogų odiškojo puvinio (*Phytophthora cactorum*).

Purkšti rudenį, jei pastebimas užkratas (rugsėjo pradžioje ar anksčiau).

Antrametes ir trečiametes braškes purkšti ne daugiau kaip 3 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Salotoms (pagal EP ir ET Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,3–0,5 kg/m³

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Bremia lactucae*).

Dirva arba substratas apdorojamas vasarą prieš sėją / sodinimą.

Norma: 0,5–0,7 kg/m³

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Bremia lactucae*).

Dirva arba substratas apdorojamas žiemą prieš sėją / sodinimą.

Dirva arba substratas apdorojamas ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Salotoms, prieš persodinimą.

Norma: 3 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Bremia lactucae*).

Purkšti prieš persodinimą (lauke).

Salotoms, po persodinimo.

Norma: 3 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Bremia lactucae*).

Purkšti po persodinimo (lauke) praėjus 1 savaitei, kai augalai gerai iššaknija ir turi 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Agurkams, auginamiems lauke.

Norma: 3–4 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Pseudoperonospora cubensis*).

Purkšti, prieš pasirodant ligos požymiams, kai susidaro palankios sąlygos ligai plisti arba

Agurkams, auginamiems lauke.

Norma: 3–4 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Pseudoperonospora cubensis*).

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.

Agurkus, auginamus lauke purkšti ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,3–0,4 proc. tirpalas.

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Pseudoperonospora cubensis*).

Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Dekoratyviems augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,05–0,1 proc. tirpalas.

Saugo nuo šaknų puvinų (*Pythium spp*) ir pašaknio ir šaknų puvinų (*Phytophthora spp.*).

Laistyti prieš arba po sodinimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dekoratyviems augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,25–0,5 proc. tirpalas.

Saugo nuo šaknų puvinų (*Pythium spp*) ir pašaknio ir šaknų puvinų (*Phytophthora spp.*)

Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams, kas 10 dienų, ne daugiau kaip 2 kartus.

Orchidėjoms.

Norma: 0,125 proc. tirpalas.

Saugo nuo šaknų puvinų (*Pythium spp*) ir pašaknio ir šaknų puvinų (*Phytophthora spp.*).

Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams, ne daugiau kaip 2 kartus.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.