



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M.  
VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-046 „DĖL INSEKTICIDO *FASTAC 50 EC*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. spalio 1 d. Nr. A1 - 643  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. A1-046 „Dėl insekticido *Fastac 50 EC* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL INSEKTICIDO *FASTAC 50* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. vasario 24 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Fastac 50* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas, ir atsižvelgdamas į BASF A/S prašymą dėl *Fastac 50 EC* pavadinimo pakeitimo į *Fastac 50*:

1. A t n a u j i n u insekticido *Fastac 50*, BASF A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui.

1.1. Veiklioji medžiaga: alfa cipermetrinas 50 g/l.

1.2. Insekticido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Degūs skystis ir garai.

Toksiškas prarijus.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. - Nerūkyti.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Įžeminti / įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

Naudoti sprogimui atsparią elektros / ventiliacijos / apšvietimo įrangą.

Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.

Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens, sausų miltelių, putų ar anglies dvideginio gesintuvus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 200 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, kvietrugiams.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,20 l/ha.

Naikina sprages, rapsinius žiedinukus, ankštarinius gumbauodžius, paslėptastraublius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 49 d.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,20 l/ha.

Naikina sprages, rapsinius žiedinukus, ankštarinius gumbauodžius, paslėptastraublius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Bulvėms.

Norma: 0,20 l/ha.

Naikina kolorado vabalus ir jų lervas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Žirniams.

Norma: 0,20 l/ha.

Naikina gumbelinius straubliukus, amarus, vaisėdžius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Pupoms.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina gumbelinius straubliukus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Gūžiniams, žiediniams kopūstams, brokoliams.

Norma: 0,20 l/ha.

Naikina sprages, baltukus, kandis.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas