



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *FOCUS ULTRA* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. lapkričio 21 d. Nr. A1-649

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Focus Ultra* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Focus Ultra*, BASF A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: cikloksidimas 100 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra cikloksidimo, bulvių ir žieminių rapsų pasėliuose dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Braškėms.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti braškes nuo pirmojo iki šešių lapelių tarpsnio (BBCH 11–16) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą;

arba

Braškių tarpueiliams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti braškių tarpueilius vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Briuseliniams kopūstams, lapiniams kopūstams, pekininiams kopūstams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki stiebas / lapų rozetė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–35), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Brokoliams, žiediniams kopūstams, gūžiniams kopūstams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki žiedynas / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Bulvėms.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo pirmo lapelio tarpsnio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 10–39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo antro lapelio tarpsnio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Griežčiams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trečio lapelio tarpsnio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 13–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Tik cikloksidimui atsparioms kukurūzų veislėms.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12–19) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Linams, pluoštiniams ir auginamiems sėmenims.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti „eglutės“ tarpsnyje (BBCH 12–19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Liucernoms, auginamoms sėklai.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo vieno lapelio tarpsnio iki pirmųjų žiedynų pasirodymo (BBCH 11–51), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti pašariniuose liucernų pasėliuose.

Morkoms.

Didžiausia naudojimo norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki šaknys pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Pastarnokams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki šaknys / gumbas pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Šakninėms petražolėms.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pupoms ir žirniams, auginamiems grūdams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio ar ūsų išsivystymo iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Pupoms šviežiam naudojimui.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Žirniams, šviežiam naudojimui.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameles vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių ar ūsų išsivystymo tarpsnio iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Vasariniams rapsams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameles vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki dviejų išėjęsusių tarpubamblių tarpsnio (BBCH 12–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Žieminiams rapsams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameles vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki dviejų išėjęsusių tarpubamblių tarpsnio (BBCH 13–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Rapsukams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameles vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki bamblių pabaigos (BBCH 13–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Šakniniams salierams, ropėms.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki šaknys / gumbas pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.

Garbanotiesiems (savojiniais) kopūstams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia iki 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Svogūnams, česnakams.

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo penkių lapelių tarpsnio iki svogūnėlis pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 15–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Vaismedžių pomedžiams.

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti iki vaisiai pasiekia pusę veislei būdingo dydžio (iki BBCH 76), ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip liepos mėn., iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Dobilams, auginamiems sėklai (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki pirmųjų žiedynų padidėjimo (BBCH 12–51), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti pašariniuose pasėliuose.

Raudoniesiems eraičiams (*Festuca rubra*), auginamiems sėklai (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo keturių lapelių iki ketvirtojo bamblio tarpsnio (BBCH 14–34), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti pašariniuose pasėliuose.

Porams (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki svogūnėlis pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 12–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.



Salotoms (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Krienams (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Gluosniams, auginamiems kurui (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Miško medžių ir krūmų sodmenims, auginamiems medelynuose (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Dekoratyviniams augalams, išskyrus miglinių šeimos augalus (*Focus Ultra* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Naudojimo norma: 1,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas