



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO
2007 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-073 „DĖL HERBICIDO *KONTAKT 320 SC*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. A1-658
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. A1-073 „Dėl herbicido *Kontakt 320 SC* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *KONTAKT 320 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. vasario 23 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Kontakt 320 SC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į Adama Registrations B.V. 2016 m. liepos 28 d. prašymą ir *Kontakt 320 SC* klasifikavimo pakeitimo išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Kontakt 320 SC*, Adama Registrations B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: fenmedifamas 320 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Sudėtyje yra ir 1,2-benzizotiazio-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti *Kontakt*[®] 320 SC ar bet kurio kito produkto augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra fenmedifamo, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti per 3 kartus, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos: pirmą kartą – *Kontakt 320 SC* 0,5 l/ha + *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,0 l/ha, antrą kartą – *Kontakt 320 SC* 0,5 l/ha + *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,0 l/ha, trečią kartą – *Kontakt 320 SC* 0,5 l/ha + *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,0 l/ha. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus.

Purškiant per 2 kartus: pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnio (runkeliai mažiausiai – 2 lapelių augimo tarpsnyje) – *Kontakt 320 SC* 0,75 l/ha + *Ethosat 500 SC* 0,4

l/ha + *Goltix 700 SC* 1,5 l/ha, antrą kartą po 5–10 dienų po pirmojo purškimo – *Kontakt 320 SC* 0,75 l/ha + *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,5 l/ha.

Purškiant per 3 kartus, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos: pirmą kartą – *Kontakt 320 SC* 0,75 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,5 l/ha, antrą kartą – *Kontakt 320 SC* 0,75 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,5 l/ha, trečią kartą – *Kontakt 320 SC* 1,0 l/ha + *Ethosat 500 SC* 0,8 l/ha. Pukšti ne daugiau kaip 3 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas