



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M. SPALIO
15 D. ĮSAKYMO NR. A1-259 „DĖL FUNGICIDO *ACANTO 250 SC* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2013 m. vasario 27 d. Nr. A1-68
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. A1-259 „Dėl fungicido *Acanto 250 SC* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *ACANTO 250 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. rugsėjo 25 d. protokole Nr. 6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į pareiškėjo Du Pont Finland pateiktą informaciją, *Acanto 250 SC* toksikologinio, liekanų ir veiksmingumo vertinimo išvadas:

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Acanto 250 SC*, Du Pont Finland Ltd, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: pikoksistrobinas 250 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną (purškiant 125 g/ha veikliosios medžiagos ir mažiau) ir 10 metrų apsaugos zoną (purškiant 250 g/ha veikliosios medžiagos) iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 5 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniam kviečiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo kviečius nuo miltligės, rudųjų, geltonųjų, juodųjų rūdžių, kviečių dryžligės, septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Žieminiam ir vasariniam miežiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo miežius nuo miltligės, smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Žieminiam rugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo rugius nuo miltligės, rudųjų, juodųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo kvietrugius nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Avižoms.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo avižas nuo miltligės, vainikuotųjų rūdžių, avižų dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams rapsams, rapsiukams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip vieną kartą, ne vėliau kaip baigiant žydėti (BBCH 69).

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, baltulių, rudmargės, dalinai nuo rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.“