



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M.  
GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-244 „DĖL FUNGICIDO *FANDANGO*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 18 d. Nr. A1-69  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-244 „Dėl fungicido *Fandango* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *FANDANGO* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Fandango* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Fandango*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 100 g/l + fluoksastrobinas 100 g/l.

Fungicido forma: koncentruota emulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 2-[2-(1-chlorciklopropil)-2-hidroksi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 50 l.

Fungicidas naudojamas:

Žiemiems ir vasariems kviečiams.

Norma: 0,8–0 l/ha

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, dalinai nuo stiebalūžės ir varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.

Žiemiems ir vasariems miežiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha

Saugo nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, rudadėmės dryžligės, ramuliarijos, rūdžių, rinchosporiozės, dalinai nuo stiebalūžės ir varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas