



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. KOVO
7 D. ĮSAKYMO NR. A1-62 „DĖL HERBICIDO *GLYPHOMAX* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI IR ĮREGISTRAVIMO INDIVIDUALIAM
NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2015 m. lapkričio 16 d. Nr. A1-703
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. A1-62 „Dėl herbicido *Glyphomax* perregistravimo profesionaliam naudojimui ir įregistravimo individualiam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *GLYPHOMAX* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI IR ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. lapkričio 29 d. protokole Nr. 6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Glyphomax* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į 2015 m. spalio 29 d. Dow AgroSciences Danmark A/S prašymą:

1. A t n a u j i n u herbicido *Glyphomax*, Dow AgroSciences Danmark A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. birželio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

1.2. Herbicido forma: vandeninis tirpalas.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 640 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Varpiniams javams.

Norma: 3 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose.

Žirniams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai paruduoja 75 proc. anksčiau, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose.

Linams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.

Pūdymams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. Į r e g i s t r u o j u herbicidą Glyphomax, Dow AgroSciences Denmark A/S, neprofesionaliajam naudojimui iki 2017 m. birželio 30 d.

2.1. Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

2.2. Herbicido forma: vandeningas tirpalas.

2.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

2.4. Pakuotė: 100 ml, 1 l.

2.5. Herbicidas naudojamas:

Vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiams.

Norma: 150 ml 10 l vandens apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Plotams, skirtiems vaismedžių ir uogynų įveisimui.

Norma: 150 ml 10 l vandens apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles, kai jos turi 4–5 lapus arba yra 10–12 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Gėlynams, vejoms.

Norma: 1 dalis Glyphomax ir 3 dalys vandens (1:3).

Aukštaūges piktžoles naikinti pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu.

Plotams, skirtiems kitų metų augalų auginimui.

Norma: 150 ml 10 l vandens apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės stadijoje, ne daugiau kaip 1 kartą.

Plotams prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją.

Norma: 100 ml 10 l vandens apdorojant 500 m².

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijoje, 5 dienos prieš sėją, sodinimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nepurkšti šalnų metu.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas