



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *INPUT* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m. gruodžio 14 d. Nr. A1-710
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Input* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u fungicido *Input*, Bayer AG, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 160 g/l + spiroksaminas 300 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksminga prarijus ar įkvėpus.

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Sudėtyje yra dez chloro protiokonazolo ir spiroksamino. Gali sukelti alergiją.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų, stiebalūžės, miltligės, kviečių dryžligės, lapų septoriozės, rudųjų rūdžių, varpų septoriozės, varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų, stiebalūžės, miltligės, tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų, stiebalūžės, miltligės, kviečių dryžligės, lapų septoriozės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, varpų septoriozės, varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Rugiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų, stiebalūžės, miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas