



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *RAPSAN 500 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2015 m. lapkričio 19 d. Nr. A1-714

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Rapsan 500 SC* registracijos ataskaitos išvadomis:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Rapsan 500 SC*, Globachem NV profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: metazachloras 500 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti garų.

Mūvėti apsaugines pirštines naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.4. Herbicidas naudojamas:

Žieminiam rapsams.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09) arba po sudygimo 2–8 lapelių (BBCH 12-18) tarpsniu ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09) arba po sudygimo 2–8 lapelių (BBCH 12-18) tarpsniu ne daugiau kaip 1 kartą.

ne daugiau kaip 1 kartą.

2. R e k o m e n d u o j u Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos įtraukti metazachlorą ir jo metabolitus į Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programą.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis