



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M. SPALIO  
17 D. ĮSAKYMO NR. A1-216 „DĖL FUNGICIDO *PREVICUR ENERGY 840 SL*  
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM IR INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2015 m. vasario 18 d. Nr. A1-71  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. A1-216 „Dėl fungicido *Previcur Energy 840 SL* įregistravimo profesionaliam ir individualiam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *PREVICUR ENERGY* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM IR  
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Previcur Energy* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Previcur Energy*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l

Fungicido forma: tirpus koncentratas

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvēti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l

Fungicidas naudojamas:

Substrato daržovėms, dekoratyviniams augalams auginti šiltnamiuose dezinfekcijai.

Naudojamas 1,25 proc. tirpalas (250 ml/20 l vandens 1 m<sup>3</sup> substrato).

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų (*Fusarium* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phoma* spp., *Phytophthora* spp., *Alternaria* spp.).

Didžiausias apdorojimų skaičius: 1

Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolinių kopūstų, briuselinių kopūstų, salotų daigams.

Daigai laistomi 0,15 proc. tirpalu (15 ml/10 l vandens).

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Agurkams, pomidorams, paprikai, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 3,0 l/ha arba 30 ml/100 m<sup>2</sup>

Laistoma lašeline drėkinimo sistema natūraliame substrate.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 3 dienoms.

Agurkams, pomidorams, paprikai, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 3,0 l/ha arba 30 ml/100 m<sup>2</sup>

Laistoma lašeline drėkinimo sistema mineraliniame substrate.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, paskutinį kartą ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 3 dienoms.

Dekoratyviniams augalams.

Naudojamas 0,2 proc. tirpalas ( 20 ml/10 l vandens).

Saugo nuo fitoftorozės, pašaknio ir šaknų puviniių sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.

Norma: 2,5 l/ha arba 25 ml/100 m<sup>2</sup>

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Peronospora* spp., *Bremia* spp.).

Purškama vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

2. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Previcur Energy*, Bayer Crop Science AG, neprofesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l

Fungicido forma: tirpus koncentratas

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml

Fungicidas naudojamas:

Substrato daržovėms, dekoratyviniams augalams auginti šiltnamiuose dezinfekcijai.

Naudojamas 1,25 proc. tirpalas (2,5 ml/200 ml vandens) sulaistyti 10 l substrato laistytuvu su smulkių skylučių tinkleliu ir išmaišyti.

Didžiausias apdorojimų skaičius: 1

Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolinių, briuselinių kopūstų, salotų daigams.

Laistoma 0,15 proc. tirpalu (15 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m<sup>2</sup>).

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinio sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.

Naudojamas 0,2 proc. tirpalas (20 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m<sup>2</sup>).

Saugo nuo fitoftorozės, pašaknio ir šaknų puvinio sukėlėjų (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviniams augalams.

Norma: 25 ml/100 m<sup>2</sup>

Saugo nuo netikrosios miltligės (*Peronospora* spp., *Bremia* spp.).

Purškama vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas