



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M. KOVO 4
D. ĮSAKYMO NR. A1-050 „DĖL FUNGICIDO *FALCON FORTE* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 18 d. Nr. A1-72
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. A1-050 „Dėl fungicido *Falcon forte* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *FALCON FORTE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. vasario 25 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Falcon forte* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Falcon forte*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 53 g/l + spiroksaminas 224 g/l + tebukonazolas 148 g/l

Fungicido forma: koncentruota emulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas prarijus.

Kenksmingas įkvėpus.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,6–0,8 l/ha

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,6–0,8 l/ha

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,6–0,8 l/ha

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,6–0,8 l/ha

Saugo nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, iš dalies nuo ramuliarijos.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 51 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas