



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M.
GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-245 „DĖL FUNGICIDO *SIGNUM*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-735
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-245 „Dėl fungicido *Signum* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *SIGNUM* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6 ir 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Signum* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 I 353, p. 1), išvadas ir į *Signum* likučių vertinimo išvadas:

1. A t n a u j i n u fungicido *Signum*, BASF A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 16 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: boskalidas 267 g/kg + piraklostrobinas 67 g/kg.

1.2. Fungicido forma: vandenyje disperguojančios granulės.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves ir braškes, 10 metrų apsaugos zoną purškiant juoduosius serbentus, avietes ir pušų sodinukus ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant kaulavaisius iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 0,5 kg, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo alternariozės, baltųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, miltligės, iš dalies nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Porams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Svogūnams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Salotoms.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Žirniams ir pupoms (grūdams).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, pupų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 21 dienai.

Braškėms.

Norma: 1,8 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, šviesmargės, miltligės, braškių juodosios dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,2 kg/ha.

Saugo nuo bulvių alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Vyšnioms, slyvoms.

Norma: 0,75 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, moniliozės, vaisių rudojo puvinio, vyšnių kokomikozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti žydėjimo pradžioje–brandos pradžioje (BBCH 59–75) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo šviesmargės, degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti po derliaus nuėmimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Avietėms.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo žievėplaišos, kekerinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Pušų sodmenims medelynuose.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pušų spygliakričio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, brokoliams (registruota pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo alternariozės, baltųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Šakniniams salierams, pastarnokams, raudoniesiems burokėliams (registruota pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, miltligės, dalinai nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Pomidorams, baklažanams, auginamiems šiltnamiuose (registruota pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 1,0–1,5 kg/ha (0,1–0,15 proc. koncentracija).

Saugo nuo kekerinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 1 dienai.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti ši įsakymą Valstybinė s augalininkystė s tarnybos prie Ž emė s ū kio ministerijos interneto svetainė je.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas