



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *MIRADOR FORTE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2017 m. vasario 6 d. Nr. A1-74

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2009 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Mirador Forte* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju fungicidą *Mirador Forte*, Adama Registrations B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: azoksistrobinas 60 g/l + tebukonazolas 100 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra tri-izobutilo fosfato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu poveikis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant javus būtina išlaikyti 5 metrų, o rapsus – 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, varpų septoriozės, miltligės, kviečių dryžligės, lapų septoriozės.

Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės, miežių septoriozės.

Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, varpų septoriozės, miltligės, lapų septoriozės.

Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Rugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės, pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti žydėjimo tarpsnyje (BBCH 60–69) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas