



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.  
BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-152 „DĖL FUNGICIDO OPERA N ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2011 m. kovo 30 d. Nr. A1- 75  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. A1-152 „Dėl fungicido Opera N įregistravimo profesionaliam naudojimui“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 56-845) ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL FUNGICIDO OPERA N ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. birželio 8 d. protokole Nr. 4 ir 2011 m. kovo 15 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Opera N*, BASF A/S profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: piraklostrobinas 85 g/l + epoksikonazolas 62,5 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Kenksmingas įkvėpus.

Kenksmingas prarijus.

Dirgina odą.

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Gali pakenkti vaisingumui.

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti aerozolio.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Siekiant apsaugoti dirvos organizmus, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra epoksikonazolo, daugiau kaip kartą per dvejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo žieminius ir vasarinius kviečius nuo kviečių dryžligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės ir miltligės.

Purkšti vegetacijos metu jautresnius ligoms veislių kviečius ar intensyviai plintant ligoms ir kai reikalinga ilgesnė apsauga.

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu mažiau jautrių ligoms veislių kviečius ar esant nepalankioms ligų plitimo sąlygoms.

Purkšti ne daugiau kaip vieną kartą, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 35 dienos.

Vasariniams miežiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo vasarinius miežius nuo tinkliškosios dryžligės, rudadėmės dryžligės, septoriozės, miltligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu jautresnius ligoms veislių miežius ar intensyviai plintant ligoms ir kai reikalinga ilgesnė apsauga.

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu mažiau jautrius ligoms veislių miežius ar esant nepalankioms ligų plitimo sąlygoms.

Purkšti ne daugiau kaip vieną kartą, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 35 dienos.

Kukurūzams.

Norma: 1,0–1,2 l/ha.

Saugo nuo kukurūzų dryžligės arba rudosios dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne vėliau nei BBCH 51 tarpsnyje, ne daugiau kaip vieną kartą.“

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas