



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. KOVO 16  
D. ĮSAKYMO NR. A1-65 „DĖL FUNGICIDO *INPUT 460 EC* ĮREGISTRAVIMO“  
PAKEITIMO**

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-792  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. A1-65 „Dėl fungicido *Input 460 EC* įregistravimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *INPUT* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. vasario 14 d. protokole Nr. 1 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Input* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į 2015 m. gruodžio 23 d. Bayer CropScience AG prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Input*, Bayer CropScience AG, profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 160 g/l + spiroksaminas 300 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus ar įkvėpus.

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Sudėtyje yra 2-[2-(1-chlorociklopropil)-2-hidroksi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiono, spiroksamino. Gali sukelti alergiją.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiam kviečiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, fuzariozės, miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam miežiui.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, tinkliškiosios dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, rudadėmės dryžligės, iš dalies nuo lapų septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas