



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *VARIANO XPRO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2014 m. kovo 4 d. Nr. A1-80

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 (a) punktu (OL 2009 L 309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Variano Xpro* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Variano Xpro*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

Veikliosios medžiagos: biksafenas 40 g/l + fluoksastrobinas 50 g/l + protiokonazolas 100 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.

Fungicidas naudojamas:

Žiemiems ir vasariems kviečiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės, varpų fuzariozės.

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žiemiems ir vasariems kvietrugiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės, varpų fuzariozės.

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žiemiems rugiams.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žiemiems ir vasariems miežiams.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės, varpų fuzariozės.

Norma: 1,0–1,25 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Jonas Lisauskas