



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-105 „DĖL  
FUNGICIDO *ARCHER TURBO 575 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. vasario 8 d. Nr. A1-81  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. A1-105 „Dėl fungicido *Archer Turbo 575 EC* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *ARCHER TURBO 575 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), atsižvelgdamas į *Archer Turbo 575 EC* registracijos ataskaitos išvadas ir į *Archer Turbo 575 EC* klasifikavimo 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Archer Turbo 575 EC*, Syngenta Polska Sp. z o.o., profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: propikonazolas 125 g/l + fenpropidinas 450 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

### 1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Kenksminga prarijus ar įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

### 1.4. Pakuotė: 5 l.

### 1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti bamblėjimo (BBCH 31-33) metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,75-1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pabaigos iki žydėjimo vidurio (BBCH 37-65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,75-1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės.

Purkšti nuo bamlėjimo pabaigos iki žydėjimo vidurio (BBCH 37-65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,75-1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės.

Purkšti nuo bamlėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 37-59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,8-1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti nuo bamlėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 32-59), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas