



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.
BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-161 „DĖL HERBICIDO *MUSTANG*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 24 d. Nr. A1-81
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. A1-161 „Dėl herbicido *Mustang* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *MUSTANG* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. birželio 6 d. protokole Nr. 4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Mustang* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Mustang*, Dow AgroSciences Danmark A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: florasulamas 6,25 g/l, 2,4-D 2-etiloheksilo-esteris 452,5 g/l

Herbicido forma: koncentruota suspensija

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,4–0,6 l/ha

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Didesniąją normą naudoti, kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis.

Purkšti, kai žieminiai kviečiai turi 2 lapelius, iki kol susiformuoja antras bamblys, o piktžolės yra ne didesnės nei 2–4 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams ir miežiams.

Norma: 0,4–0,6 l/ha

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Didesniąją normą naudoti, kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis.

Purkšti, kai javai turi 2 lapelius, iki kol susiformuoja antras bamblys, o piktžolės yra ne didesnės nei 2–4 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.“