



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *FURY 100 EW* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. vasario 24 d. Nr. A1-82
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Fury 100 EW* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u insekticidą *Fury 100 EW*, FMC Chemical sprl, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Veiklioji medžiaga: zeta cipermetrinas 100 g/l.

Insekticido forma: aliejinė vandeninė emulsija.

Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Kenksmingas įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną purškiant rapsus ir bulves bei 15 metrų apsaugos zoną purškiant javus iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ir uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių. Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo.

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Insekticidas naudojamas:

Žieminiam kviečiams.

Naikina amarus, lemus, javinius pjūklelius, javinius tripsus.

Norma: 0,07–0,1 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiam kvietrugiams.

Naikina amarus, lemus, javinius pjūklelius, javinius tripsus.

Norma: 0,15 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Vasariniams miežiams.

Naikina amarus, lemus, javinius pjūklelius.

Norma: 0,07–0,1 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiam ir vasariniam rapsams.

Naikina sprages, rapsinius žiedinukus.

Norma: 0,07–0,1 l/ha.

Purkšti nuo skilčialapių tarpsnio iki matomų pirmųjų žiedlapių, tačiau butonams dar neišsiskleidus (geltonojo butono) tarpsnio (BBCH 09 – 59) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Bulvėms.

Naikina kolorado vabalus.

Norma: 0,07–0,1 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas