



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *EPOX EXTRA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2013 m. kovo 6 d. Nr. A1- 85
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *EpoX extra* registracijos ataskaitos išvadamis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *EpoX extra*, Makhteshim-Agan Holland B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 50 g/l + folpetas 375 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

Sudėtyje yra folpeto ir metinamino. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų, aerozolių

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais, iki paviršinių vandens telkinių.

Pakuotė: 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, septoriozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, septoriozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rinchosporiozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rinchosporiozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas