



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR.A1-181 „DĖL
HERBICIDO *LONTREL 72 SG* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 24 d. Nr. A1- 85
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-181 „Dėl herbicido *Lontrel 72 SG* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *LONTREL 72 SG* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. gegužės 24 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Lontrel 72 SG* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

p e r r e g i s t r o j u herbicidą *Lontrel 72 SG*, Dow Agro Sciences Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: klopivalidas 720 g/kg

Herbicido forma: vandenyje tirpiosios granulės

Herbidas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra krūmijimosi–paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21–37) tarpsniuose ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra krūmijimosi–paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21–37) tarpsniuose ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,110–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai rapsų 1 tarpubamblis ištįsęs–butonai matosi iš viršaus (žali butonai) (BBCH 31–51 tarpsnyje) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,110–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai rapsų išsivystęs antras lapas–butonai matosi iš viršaus (žali butonai) (BBCH 12–51 tarpsnyje) ne daugiau kaip 1 kartą.

Kukurūzams.

Norma: 0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai kukurūzai turi 3–6 lapelius (BBCH 13–16) ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, burokėliams.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai cukriniai ir pašariniai runkeliai arba burokėliai turi 2–4 tikruosius lapelius (BBCH 12–15) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Usnims, esant 15–20 cm aukščio, naudoti 0,165 kg/ha normą.

Braškėms.

Norma: 0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuėmus braškių derlių ne daugiau kaip 1 kartą.

Varpinėms žolėms sėklai.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai varpinės žolės sėklai yra krūmijimosi–paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21–37) tarpsniuose ne daugiau kaip 1 kartą.

Ganykloms.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai ganyklos yra BBCH 21–37 augimo tarpsniuose ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nepurkšti, kai ganyklose yra ankštinių augalų.

Linams.

Norma: 0,125 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai linai yra pirmųjų tikrųjų lapelių–eglutės (BBCH 12–19) tarpsnio, o piktžolės – skrotelės tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžiniams ir žiediniams kopūstams.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai kopūstai yra vėlesnio nei dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio ($> \text{BBCH } 12$), o piktžolės – skrotelės tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Juodiesiems ir raudoniesiems serbentams.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti serbentų pokrūmius, apsaugant žaliąsias serbentų dalis, kai piktžolės yra skrotelės tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas