



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKymo NR. A1-174 „DĖL
FUNGICIDO *INFINITO* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM IR
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 24 d. Nr. A1-89
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. A1-174 „Dėl fungicido *Infito* perregistravimo profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *INFINITO* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM IR
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. balandžio 27 d. protokole Nr. AS1-3 ir 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Infito* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

1. P e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Infito*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2021 m. gegužės 31 d.

Veikliosios medžiagos: propamokarbohidrochloridas 625 g/l + fluopikolidas 62,5 g/l

Fungicido forma: koncentruota suspensija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto rūgščiuose dirvožemiuose.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, naudoti produktą pagal nurodytus naudojimo reglamentus ne dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 1,2–1,6 l/ha

Saugo nuo maro.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu 0,14 proc. koncentracijos tirpalu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Gūžiniams, žiediniams, briuseliniais kopūstams, brokoliniams kopūstams.

Norma: 1,6 l/ha

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Porams.

Norma: 1,6 l/ha

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Svogūnams.

Norma: 1,6 l/ha

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

2. **P e r r e g i s t r u o j u** fungicidą *Infito*, Bayer Crop Science AG, neprofesionaliajam naudojimui iki 2021 m. gegužės 31 d.

Veikliosios medžiagos: propamokarbo hidrochloridas 625 g/l + fluopikolidas 62,5 g/l

Fungicido forma: koncentruota suspensija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto rūgščiuose dirvožemiuose.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, naudoti produktą pagal nurodytus naudojimo reglamentus ne dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Pakuotė: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 30–40 ml produkto atskiesti 10 l vandens ir nupurkšti 250 m².

Saugo nuo maro.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu 0,14 proc. koncentracijos tirpalu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Gūžiniams, žiediniams, briuseliniais kopūstams, brokoliniams kopūstams.

Norma: 30 ml produkto atskiesti 10 l vandens ir nupurkšti 200 m².

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Porams.

Norma: 30 ml produkto atskiesti 10 l vandens ir nupurkšti 200 m².

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Svogūnams.

Norma: 30 ml produkto atskiesti 10 l vandens ir nupurkšti 200 m².

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas