



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.
GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A1-311 „DĖL FUNGICIDO *CANDIT*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. vasario 25 d. Nr. A1-97
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. A1-311 „Dėl fungicido *Candit* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *CANDIT* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. lapkričio 27 d. protokolo Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Candit* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Candit*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: krezoksim metilas 500 g/kg

Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Laikyti užrakintą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną vaiskrūmiams ir 20 metrų apsaugos zoną vaismedžiams iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto smėlinguose su mažu organinių medžiagų kiekiu dirvožemiuose.

Pakuotė: 0,2 kg

Fungicidas naudojamas:

Obelims, kriaušėms.

Norma: 0,2 kg/ha

Saugo nuo rauplių, miltligės, vaisių puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 35 d.

Serbentams.

Norma: 0,2 kg/ha

Saugo nuo serbentų tamsiosios miltligės, veimutrūdės, degulių, serbentų šviesmargės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.

Braškėms.

Norma: 0,2 kg/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.

Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu 0,02 proc. tirpalu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 4 d.

Dekoratyviems augalams.

Saugo nuo rožių miltligės, rožių rudosios dėmėligės, begonijų miltligės, fitoftoros, chrizantemų rūdžių, gvazdikų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu 0,02 proc. tirpalu (nuo chrizantemų rūdžių – 0,1 proc.) ne daugiau kaip 3 kartus.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas