



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGPJŪČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-563
„DĖL FUNGICIDO MARACAS ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2019 m. vasario 21 d. Nr. A1-99
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. A1-563 „Dėl fungicido *Maracas* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO MARACAS ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, įgyvendindamas 2019 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/168, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) padermės QST 713, *Bacillus thuringiensis* porūšio *Aizawai*, *Bacillus thuringiensis* porūšio *israeliensis*, *Bacillus thuringiensis* porūšio *kurstaki*, *Beauveria bassiana*, benfluralino, klodinafopo, klopivalido, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinilo, dichlorpropo-P, epoksikonazolo, fenpiroksimato, fluazinamo, flutolanilo, fosetilo, *Lecanicillium muscarium*, mepanipirimo, mepikvato, *Metarhizium anisopliae* var. *Anisopliae*, metkonazolo, metrafenono, *Phlebiopsis gigantea*, pirimikarbo, *Pseudomonas chlororaphis* padermės MA 342, pirimetanilo, *Pythium oligandrum*, rimsulfurono, spinozado, *Streptomyces K61*, tiakloprido, metiltolkofoso, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum*, triklopiro, trineksapako, tritikonazolo, *Verticillium albo-atrum* ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL 2019 L 33, p. 1), bei atsižvelgdamas į Adama Registrations B.V. 2019 m. vasario 13 d. prašymą:

1. Įregistruoju fungicidą *Maracas*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2021 m. balandžio 30 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 50 g/l + prochlorazas 225 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Sudėtyje yra propano rūgšties 2-hidroksi–2-etilheksilesterio. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistemas.

Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).

Inžinerinės kontrolės priemonės gali pakeisti asmens apsaugos priemonės, jeigu jos užtikrina lygiavertę arba didesnę apsaugą.

1.4. Pakuotė: 1, 5, 10 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30–59) 2 kartus po 1,0 l/ha arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Apsaugai nuo stiebalūžės purkšti 2,0 l/ha (BBCH 30–32). Didžiausia norma per sezoną – 2,0 l/ha.

Pastaba: mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios ir rudadėmės dryžligės, rinchosporiozės, miltligės, smulkiųjų rūdžių, miežių septoriozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0 l/ha arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma per sezoną – 2,0 l/ha.

Pastaba: mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30–59) 2 kartus po 1,0 l/ha arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma per sezoną – 2,0 l/ha.

Pastaba: mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

Rugiams

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo rinchosporiozės, miltligės, rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0 l/ha arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma per sezoną – 2,0 l/ha.

Pastaba: mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

Avižoms

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, avižų dryžligės.

Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) 2 kartus po 1,0 l/ha arba 1 kartą 2,0 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms. Didžiausia norma per sezoną – 2,0 l/ha.

Pastaba: mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė