



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL FUNGICIDO *CURBATUR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2018 m. spalio 15 d. Nr. A1-573
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdama į Bayer AG 2018 m. rugsėjo 28 d. prašymą:

1. Įregistruoju fungicidą *Curbatur*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: protiokonazolas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklintas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Sudėtyje yra protiokonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 5 l, 15 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, speltoms.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki pradeda formuotis grūdas (BBCH 30–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, varpų fuzariozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, rinchosporiozės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Rugiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė