



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.  
BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. A1-73 „DĖL HERBICIDO *MEZZO WG*  
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. rugpjūčio 12 d. Nr. A1-575  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl herbicido *Mezzo WG* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *MEZZO WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. kovo 28 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Mezzo WG* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Mezzo WG*, *Nufarm GmbH&Co KG*, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: metsulfuron metilas 200 g/kg

Herbicido forma: vandenyje dispersiškos granulės

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo

instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 50 g, 100g.

Herbidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 15 g/ha.

Naikina trumpaamžes dviskiltes piktžoles.

Purkšti javų krūmijimosi – stiebo augimo tarpsniuose (BBCH 21–32), esant palankioms augimo sąlygoms ir vyraujant 2–4 lapelių dydžio jautrioms piktžolių rūšims, kartu su paviršiaus aktyviaja medžiaga 0,05 proc. tirpalo kiekio, ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

arba

Žieminiams kviečiams.

Norma: 30 g/ha.

Naikina trumpaamžes dviskiltes piktžoles.

Purkšti javų krūmijimosi – paskutinio lapo augimo tarpsnyje (BBCH 21–39), mažiau palankiomis augimo sąlygomis ir vyraujant daugiau kaip 4 lapelių dydžio piktžolėms, kartu su paviršiaus aktyviaja medžiaga 0,05 proc. tirpalo kiekio, ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 10 g/ha.

Naikina trumpaamžes dviskiltes piktžoles.

Purkšti javų dviejų lapelių – krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 12–25), esant palankioms augimo sąlygoms ir vyraujant 2–4 lapelių dydžio jautrioms piktžolių rūšims, kartu su paviršiaus aktyviaja medžiaga 0,05 proc. tirpalo kiekio, ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 20 g/ha.

Naikina trumpaamžes dviskiltes piktžoles.

Purkšti javų krūmijimosi – paskutinio lapo augimo tarpsniuose (BBCH 21–39), mažiau palankiomis augimo sąlygomis ir vyraujant daugiau kaip 4 lapelių dydžio piktžolėms, kartu su paviršiaus aktyviaja medžiaga 0,05 proc. tirpalo kiekio, ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas