



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO AMPERA REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m. gruodžio 9 d. Nr. A1-698

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Ampera* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u fungicido *Ampera*, Adama Registrations B.V., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 133 g/l + prochlorazas 267 g/l.

1.2. Fungicido forma: aliejinė vandeninė emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksminga prarijus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 2-etilheksil-S-laktato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmogaus sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės, miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės, tinkliškosios dryžligės, miltligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Avižoms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės, avižų dryžligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, septoriozės, varpų fuzariozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rapsams

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio.

Purkšti yra žydėjimo pradžios iki pradėjus kristi žiedlapiams (BBCH 61–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 63 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas