



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M. LIEPOS
27 D. ĮSAKYMO NR. A1-198 „DĖL FUNGICIDO *AMISTAR 250 SC* PERREGISTRAVIMO
IR NAUDOJIMO IŠPLĖTIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-785
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. A1-198 „Dėl fungicido *Amistar 250 SC* perregistravimo ir naudojimo išplėtimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL FUNGICIDO *AMISTAR 250 SC* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. liepos 10 d. protokole Nr. 5 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Amistar 250 SC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas ir į 2015 m. gruodžio 21 d. Syngenta Polska Sp. z o.o. prašymą:

1. A t n a u j i n u fungicido *Amistar 250 SC*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: azoksistrobinas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,75-1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, varpų juodligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, varpų juodligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Vasariniams miežiams.

Norma 0,75-1,0 l/ha.

Saugo nuo dryžligės, smulkiųjų rūdžių, ramuliarijos, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Žieminiams ir vasariniams rapsai.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotininio) puvinio, pilkojo puvinio, fomezės (dalinė apsauga).

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Svogūnams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti ropelių formavimosi tarpsnyje, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Kopūstams (vidutinio vėlyvumo ir vėlyviesiems).

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės.

Purkšti gūžių formavimosi tarpsnyje, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Morkoms.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo alternariozės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 d.

Pomidorams šiltnamiuose.

Norma 0,1 proc. tirpalas.

Saugo nuo sausligės, maro.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“