



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *AMISTAR XTRA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-787
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 43 straipsnio 6 punktu, atsižvelgdamas į *Amistar Xtra* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir Syngenta Polska Sp. z o.o. 2015 m. gruodžio 21 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Amistar Xtra*, Syngenta Polska Sp. z o.o., profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: azoksistrobinas 200 g/l + ciprokonazolas 80 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksminga prarijus ar įkvėpus.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, dryžligės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio puvinio), pilkojo puvinio, fomezės (dalinė apsauga).

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas