



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.
BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-78 „DĖL HERBICIDO *ETHOFOL 500 SC*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. vasario 4 d. Nr. A1-70
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-78 „Dėl herbicido *Ethofol 500 SC* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ETHOFOL SC* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. kovo 28 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Ethofol SC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Ethofol SC*, UPL Europe Ltd., profesionaliajam naudojimui.

1.1. Veiklioji medžiaga: etofomezatas 500 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti *Ethofol SC* ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra etofomezato daugiau kaip 1,0 kg etofomezato ha per trijų auginimo sezonų laikotarpį.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 1 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams.

Norma: 1,2 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti per 3 kartus po 0,4 l/h mišinyje su Betasana 1,5 l/ha ir alyvos 0,2–0,7 l/ha, pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo, antrą kartą – po 5–8 dienų, trečią kartą – po 10–14 dienų po antro purškimo.

Pasėlius purkšti per 2 kartus po 0,6 l/h mišinyje su Betasana 2,25 l/ha ir alyvos 0,2–0,7 l/ha, pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 lapelių tarpsnio, o runkeliai turi 2 lapelius, antrą kartą – po 5–10 dienų;

Pasėlius purkšti 1 kartą – 1,2 l/ha mišinyje su Betasana 4,5 l/ha ir alyvos 0,2–0,7 l/ha, kai runkeliai turi 4 lapelius.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“