

SCORE 250 EC
A7402T

FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: **difenokonazolas 250 g/l (23,6%)**
Produkto forma: **koncentruota emulsija**

Score 250 EC – sisteminio veikimo, **triazolų** cheminės klasės fungicidas, skirtas obelims, kriaušėms, slyvoms ir vyšnioms nuo grybinių ligų apsaugoti.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui



PAVOJINGAS

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

Sukelia smarkų akių dirginimą

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Saugoti, kad nepatektų į aplinką

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į **APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ** arba kreiptis į gydytoją

NESKATINTI vėmimo

Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją

Surinkti ištekėjusią medžiagą

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 25 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 2 ml, 10 ml.

Registracijos Nr.: 0047F/13.

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

® Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas

Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija

Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklinimą: Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva. Tel. 8 5 2420017.

© *Syngenta Crop Protection AG*

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

VEIKIMO BŪDAS

Score 250 EC – sisteminio veikimo, **triazolų** cheminės klasės fungicidas, skirtas obelims, kriaušėms, slyvoms ir vyšnioms nuo grybinių ligų apsaugoti.

Difenokonazolas įsisavinamas žaliose augalo dalyse. Tai lokalaus sisteminio veikimo medžiaga greitai patenkanti į augalą ir judanti tarpuląščiais. Veikia stabdydamas sterolų biosintezę ligų sukėlėjų dygstančių sporų sporadaigiuose, neleidamas toliau vystytis grybienai. *Difenokonazolui* būdingas stiprus apsauginis ir gydomasis veikimas, veikia - 10 dienų.

Veiksmingas nuo obelių ir kriaušių rauplių (*Venturia inaequalis*) ir iš dalies veiksmingas nuo miltligės (*Podosphaera leucotricha*).

Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.

NAUDOJIMAS

Augalas	Ligos	Naudojimo norma, ml/10l vandens	Tirpalo koncentracija, %	Purškimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius
Obelys	Obelių rauplės (<i>Venturia inaequalis</i>); Miltligė (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	2,0	0,02	Naudojamas nuo žydėjimo pradžios (BBCH 61) iki vaisių brandos vidurio (BBCH 84). Panaudojus pirmą kartą, po 10 dienų purškimas kartojamas.	2
Kriaušės	Kriaušių rauplės (<i>Venturia pirina</i>); Miltligė (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	2,0	0,02	Naudojamas nuo žydėjimo pradžios (BBCH 61) iki vaisių brandos vidurio (BBCH 84). Panaudojus pirmą kartą, po 10 dienų purškimas kartojamas.	2
Slyvos, vyšnios	Moniliozė (<i>Monilia spp.</i>)	2,0	0,02	Naudojamas žydėjimo metu (BBCH 61 - 69). Panaudojus pirmą kartą, po 10-14 dienų purškimas kartojamas.	2

Dėmesio!

Score 250 EC naudojamas pačiu kritiškiausiu rauplėgrybio plitimo metu, kai infekcija jau plinta konidijomis. Pirmiems purškimams rekomenduojama naudoti kontaktinius fungicidus. Smarkiai plintant ligoms intervalai tarp purškimų ne turėtų būti ilgesni nei 10 dienų. Tinka integruotai augalų apsaugos sistemai.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Score 250 EC sudėtyje esantis difenokonazolas priklauso triazolų grupės veikliosioms medžiagoms, kurių pagrindinis veikimas yra ergosterolio biosintezės blokavimas ir ląstelių sienelių membranos suardymas. Pagal veikimo pobūdį difenokonazolas priklauso demetilinimo inhibitoriams (DMI) (FRAC kodas G1). DMI fungicidams nebūdingas kryžminis atsparumas kitų klasių fungicidams.

FRAC rekomenduoja laikytis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonių. **Score 250 EC** būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, registruotomis normomis.

- sezono metu neturi būti purškiama daugiau nei 2 kartus.
- turi būti naudojamas integruotoje augalų apsaugos programoje kaitaliojant su kitais fungicidais priklausančiais skirtingoms cheminėms grupėms ir pakankamai veiksmingais nuo minimų ligų.
- produktai savo sudėtyje turintys DMI fungicidų grupės veikliąją medžiagą sezono metu neturėtų būti naudojami daugiau kaip 50% visų purškimų.
- Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje.

FITOTOKSIŠKUMAS

Kai **Score 250 EC** naudojamas laikantis naudojimo rekomendacijų - normų ir laiko, vaismedžiams nėra fitotoksiškas.

KARENCIJA

Nuo paskutinio purškimo iki vaisių skynimo:

Obelims, kriaušėms - 21 diena;

Slyvoms, vyšnioms – 14 dienų.

TIRPALO RUOŠIMAS

Į purkštuvą talpą supilti pusę purškimui skirtą vandens, tuomet supilti tiksliai pamatuotą produkto kiekį. Gerai išmaišyti ir supilti likusį vandens kiekį. Tirpalą išpurkšti tą pačią dieną. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

Vengti išpurškiamos miglos nunešimo ant greta augančių augalų ar į vandens telkinius. Po darbo purkštuvą ir jo sudedamąsias dalis kruopščiai išplauti švari vandeniu.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus ir dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį.

Purškiant nugariniais (rankiniais) purkštuvais rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Eiti į apdorotus sodų plotus ir dirbti juose galima tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Dirbant rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. **Higienos priemonės.** Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Suteptus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: neskatinėti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS

Tuščią pakuotę išplaukite tris kartus, paplavus supilkite į purkštuvą ir išpurškite ant apdoroto ploto.
Tuščią pakuotę sunaikinkite laikantis vietinių reikalavimų ir taisyklių.
Nenaudokite tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SANDĖLIAVIMAS

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu -5°C ir ne aukštesnėje negu $+35^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti.
Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių fitopatogeninių organizmų, nuo kurių produktas gali būti neveiksmingas. Tokių organizmų atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

® Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas.

© Syngenta Crop Protection AG.