

RAUSVŪJŲ DOBILŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINIŲ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI

RAUSVIEJI DOBILAI

Lomiai.....	1
Poliai.....	1

Lomiai. Rausvųjų dobilų veislė sukurta *Lietuvos žemdirbystės institute*.

‘Lomių’ veislės dobilų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai atlikti 2001–2003 m. Plungės ir Pasvalio AVT stotyse. Įrengtuose dobilų veislių bandymuose gautas vidutinis 4,94 t ha⁻¹ jų žalios masės sausų medžiagų ir 0,16 t ha⁻¹ sėklų derlius. Didžiausias žalios masės sausų medžiagų derlius buvo gautas 2002 m. Pasvalio AVT stotyje – 6,19 t ha⁻¹.

Atlikus laboratorines analizes ‘Lomių’ veislės rausvųjų dobilų žalios masės sausoje medžiagoje buvo nustatyta 17,8–20,7 proc. baltymų ir 11,7–16,1 proc. ląstelienos. Bandymuose išaugintame derliuje lapai vidutiniškai sudarė 32,6 proc. bendro žalios masės derliaus.

‘Lomių’ veislės dobilai nepalankiomis daugiamečiams augalams 2001/2002 m. ir 2002/2003 m. žiemomis (2000 m. ir 2001 m. sėjos) Plungės AVT stotyje žuvo, tačiau patenkinamai peržiemėjo Pasvalio AVT stotyje. Todėl jų ištvermingumas žiemojimui vidutiniškai įvertintas 5,4 balo. Šios veislės dobilų augalų vidutinis aukštis – 40 cm. Jie palyginti atsparūs išgulimui. Šis jų požymis įvertintas 7,2 balo.

‘Lomių’ veislės rausvųjų dobilų vegetacijos periodo vidutinė trukmė – 151 diena (skaičiuojant nuo sausio mėn. 1 d. iki pirmos pjūties).

Tyrimo metais šios veislės augalus labai mažai pažeidė ligos.

Poliai. Veislė sukurta *Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Žemdirbystės institute*.

Veislės ‘Poliai’ ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2012 m. Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais šios veislės augalai užaugino vidutiniškai 9,84 t ha⁻¹ sausųjų medžiagų derlių (standartinė veislė ‘Lomiai’ – 10,01 t ha⁻¹).

Augalų aukštis su žiedynais plaukėjimo pradžios metu (prieš 1-ąją pjūtį) siekia 86,50 cm. Ištvermingumas žiemojimui buvo įvertintas 6,90 balais, o atsparumas išgulimui – 6 balais. Augalų lapuotumas siekia 52,25 proc. Žaliosios masės sausojoje medžiagoje baltymų yra 19,80 proc.,

laštelienos – 29,15 proc. (standartinė veislė ‘Lomia’ – 20,83 proc. ir 28,15 proc.). Vegetacijos periodas iki 1-os pjūties – 173,50 dienos.