

# GAUSIAŽIEDŽIŲ SVIDRIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, CHARAKTERISTIKOS

## GAUSIAŽIEDĖS SVIDRĖS

psl.

Bormitra.....	1
Ugnė .....	1

**Bormitra.** Gausiažiedžių vienamečių svidrių veislė sukurta Vokietijoje, Saatucht Steinach GmbH sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2005–2006 m. Plungės ir Pasvalio AVT stotyse. Tyrimo metais bandymuose gautas vidutinis  $10,59 \text{ t ha}^{-1}$  sausų medžiagų ir  $1,23 \text{ t ha}^{-1}$  sėklų derlius. Didžiausias sausų medžiagų derlius gautas 2005 m. Pasvalio AVT stotyje –  $17,20 \text{ t ha}^{-1}$ . Atskirais ‘Bormitra’ veislės tyrimo metais išaugintame derliuje – žalios masės sausoje medžiagoje nustatyta: baltymų 17,9–20,5 proc., o ląstelienos – 15,3–18,3 proc.

‘Bormitra’ veislės svidrių augalai pasižymi palyginti geru lapuotumu. Bandymuose išaugintame derliuje lapai vidutiniškai sudarė 47,9 proc. bendro augalų žalios masės derliaus. Šių svidrių augalų vidutinis aukštis 62 cm. Veislės tyrimo metais augalai praktiškai neišgulė. Jų atsparumas išgulimui įvertintas net 8,8 balo. ‘Bormitra’ veislės vienamečių svidrių vegetacijos periodo vidutinė trukmė 46 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki pirmos pjūties).

Bandymuose šios veislės augalus mažai pažeidė ligos. Nustatytas tik nedidelis augalų pažeidimas rūdimis (5 proc.).

### Į viršų ↑

**Ugnė.** Gausiažiedžių svidrių veislė sukurta Lietuvos žemdirbystės institute. Veislę sukūrė prof. habil. dr. Algirdas Sliesoravičius ir dr. Steponas Nekrašas. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2007–2008 m. Plungės ir Pasvalio AVT stotyse. Tyrimo metais bandymuose buvo gautas vidutinis  $11,32 \text{ t ha}^{-1}$  sausų medžiagų ir  $1,44 \text{ t ha}^{-1}$  sėklų derlius. Didžiausias sausų medžiagų derlius gautas 2008 m. Pasvalio AVT stotyje –  $16,64 \text{ t ha}^{-1}$ . Atskirais ‘Ugnės’ veislės tyrimo metais išaugintame derliuje – žalios masės sausoje medžiagoje nustatyta: baltymų 10,6–14,0 proc., o ląstelienos – 21,4–22,7 proc.

‘Ugnės’ veislės svidrių augalai pasižymi palyginti labai geru lapuotumu. Bandymuose išaugintame derliuje lapai vidutiniškai sudarė 50 proc. bendro augalų žalios masės derliaus.

Šios veislės svidrių ištvermingumas žiemojimui vidutiniškai įvertintas 6,9 balo (pagal 9 balų skalę). ‘Ugnės’ veislės svidrių augalų vidutinis aukštis 79 cm. Veislės tyrimo metais augalai praktiškai neišgulė. Jų atsparumas išgulimui įvertintas 8,6 balo. ‘Ugnės’ veislės gausiažiedžių

svidrių vegetacijos periodo vidutinė trukmė 151 diena (skaičiuojant nuo sausio mėn. 1 d. iki pirmos pjūties).

Bandymuose šios veislės augalus mažai pažeidė ligos. Nustatytas tik nedidelis rūdžių pažeistų augalų kiekis (10 proc.).

[Į viršų ↑](#)