

BUMPER[®] SUPER 490 EC
Bamper[®] super 490 g/l k.e.

Fungicidas

Veikliosios medžiagos: prochlorazas 400 g/l + propikonazolas 90 g/l.

Koncentruota emulsija

Veikimo spektras: triazolų grupės sisteminis ir translaminarinis plataus veikimo spektro fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei cukrinių runkelių grybinėms ligoms naikinti.

Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui!



PAVOJINGAS APLINKAI



DIRGINANTIS

DĖMESIO!

Dirgina akis.

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Vengti patekimo į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 1, 5, 25, 200 l

Registracijos Nr. 0283F/06

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo

Partijos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Makhteshim-Agan Holland B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

The Netherlands

Tel: +31 33 494 84 94

Fax: +31 33 494 80 44

Kilmės šalis:

ARAGONESAS

Paseo de Recoletos 27, 4^o,

Madrid 28004

Spain

Importuotojai ir platintojai Lietuvoje:

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.**

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Bamper super plataus spektro sisteminis ir translaminarinis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei cukrinių runkelių ligoms naikinti. Efektyvus prieš stiebalūžę, septoriozę, rūdis, miltligę, dryžligę, lapų baltulius, rudamargę, fomozę. Bamperis super į augalą patenka per lapus bei stiebą ir pasklinda visame augale.

Preparatas naudojamas :

žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose Stiebalūžė, septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė, dryžligė, varpinių augalų juodligė.

Naudojimo laikas ir normos

Preparatas naudojamas pasirodžius pirmiesiems vienos iš aukščiau paminėtų ligų požymių.

Nuo stiebalūžės purškama BBCH 29-32 augimo fazėje.

Nuo kitų ligų - septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės, dryžligės ir varpinių augalų juodligės preparatas purškiamas BBCH 29-59 augimo fazėje 1-2 kartus.

Rekomenduojama preparato norma : 1 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai.

Rekomenduojama tirpalo norma : 250-300 l/ha

Karencijos laikas - 20 dienų.

Preparatas naudojamas:

Cukriniuose runkeliuose Lapų baltuliai, rudamargė, fomozė.

Naudojimo laikas ir normos

Preparatas naudojamas pasirodžius pirmiesiems vienos iš aukščiau paminėtų ligų požymių. Preparatas purškiamas vegetacijos metu.

Rekomenduojama preparato norma : 0,8- 1 l/ha

Didžiausias purškiamų skaičius - 2 kartai.

Rekomenduojama tirpalo norma : 250-300 l/ha

Karencijos laikas - 20 dienų.

Tirpalo ruošimas ir naudojimo technika

Prieš naudojimą preparatą suplakti.

Reikiamą preparato kiekį supilkite į pusiau pripildytą vandeniu purkštuvu talpą, gerai sumaišykite. Įjunkite purkštuvu maišyklę, supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite. Praplaukite kelis kartus tuščią tarą vandeniu ir supilkite jį į talpą su tirpalu.

Maišyklės neišjunkite viso purškimo metu.

Padarius pertrauką purškimo metu, tirpalas turi būti pakartotinai gerai išmaišomas prieš purškimo pradžią.

Baigę darbą, purkštuvą praplaukite vandeniu.

Pastaba: nenaudoti tuščios taros kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS

Sudėtyje yra purpikonazolo. Gali sukelti alergiją.

Dėvėkite apsauginius drabužius ir asmenines apsaugines priemones: cheminėms medžiagoms atsparią avalynę ir pirštines, apsauginius akinius arba veido skydą bei respiratorių.

Darbo metu ir preparato saugojimo vietose nevalgyskite, negerkite ir nerūkykite.

Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose.

Laikykitės darbo su augalų apsaugos preparatais taisyklių.

Baigę darbą, nusiprauskite su vandeniu ir muilu, praskalaukite burnos ertmę bei persirenkite.

LAIKYMAS

Laikyti tik originalioje sandariai uždarytoje taroje, sausoje gerai vėdinamoje patalpoje, pliusinėje temperatūroje.

Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašaro.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies.

Laikyti vaikams ir kitiems asmenims nesiekiamose vietose.

PIRMOJI PAGALBA

Prarijus, vėmimo sukelti negalima. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis, plauti jas švariu vandeniu 10 min., kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos, nusivilkti drabužius, odą nuplauti vandeniu su muilu, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus, išnešti nukentėjusį į gryną orą, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Rekomendacijos gydytojui: šiam preparatui priešnuodžio nėra. Išplauti skrandį, vengti skrandžio turinio patekimo į plaučius. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

8 5 2362052

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS

Ištuštintą ir vandeniu išplautą tuščią tarą sunaikinkite pagal vietinius reikalavimus. Paplavas supilkite į purkštuvų talpą ir išpurškite.