

Candit[®]

(Candit 500 g/kg. v.d.g.)



FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: **krezoksim-metilas 500 g/kg**

Produkto forma: **vandenyje dispersiškos granulės**

Paviršiaus sisteminio veikimo, strobilurinių grupės fungicidas, naudojamas nuo miltligės, rauplių, vaisių puvinių obelyse ir kriaušėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, šiltnaminiuose agurkuose ir dekoratyviniuose augaluose.

Skirtas profesionaliam naudojimui



KENZSMINGAS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Įtariama, kad gali sukelti vėžį

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Saugoti nuo vaikų

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines

Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus vaiskrūmiams ir 20 metrų sodams iki paviršinių vandens telkinių, jeigu nėra nustatyti kitokie apsauginiai atstumai pagal paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto smėlinguose su mažu organinių medžiagų kiekiu dirvožemiuose.

Pakuotė: 0,2 kg
Registracijos numeris: 0192F/07
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Copenhagen S, Danija.

Kilmės šalis: BASF SE D-67056 Ludwigshafen, Vokietija.

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva Tel.: 8-5 2107450, faksas: 8-5 2107458.

Pirmoji pagalba

Bendras patarimas: nusivilkite užterštus drabužius. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui pakuotę, etiketę ir/ar saugos duomenų lapus.

Įkvėpus: nuraminkite nukentėjusį, išveskite į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant švariai nuplaukite gausiu vandens kiekiu su muilu. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plaukite paveiktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu, vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus: nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.

Pastaba gydytojui: gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas), specifinis priešnuodis nežinomas.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370-5-2362052

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112

Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Candit veiklioji medžiaga krezoksim-metilas priklauso strobilurinių grupei. Dėl paviršiaus sisteminio veikimo ir labai gero atsparumo lietuvi, Candit turi ypatingai gerą ir ilgalaikį apsauginį poveikį nuo ligų.

Candit, naudojamas nuo rauplių soduose, turi apsauginį ir gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą.

Serbentuose, agurkuose ir dekoratyviniuose augaluose Candit reikia naudoti profilaktiškai.

Krezoksim-metilas yra švelnaus veikimo ir niekada nepalieka rudų dėmių po nupurškimo visuose augaluose, kuriuose yra bandytas (tai svarbu gėlių augintojams).

AUGALAI IR NORMOS

Obelys ir kriaušės

Obelių rauplės	<i>Venturia inaequalis</i>
Miltligė	<i>Podosphaera leucotricha</i>
Vaisių puviniai	<i>Gloeosporium spp.</i>

Norma: 0,2 kg/ha Candit

Nuo rauplių sodai purškiami profilaktiškai po žydėjimo arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams 3 kartus iš eilės 7-14 dienų intervalu.

Nuo miltligės purškite infekcijos pradžioje, kai miltligė pasirodo ant lapų ir ūglių. Laikas nuo vieno purškimo iki kito derinamas atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą. Norėdami išvengti atsparumo, naudokite Candit (0,2 kg/ha) mišinyje su Effector® (0,5 kg/ha).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos

Didžiausias purškimų skaičius - 3

Raudonieji ir juodieji serbentai

Serbentų tamsioji miltligė	<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>
Veimutrūdės	<i>Cronartium ribicola</i>
Deguliai	<i>Drepanopeziza ribis</i>
Serbentų šviesmargė	<i>Mycosphaerella ribis</i>

Norma: 0,2 kg/ha Candit arba 0,02 % tirpalo koncentracija.

Purškiama profilaktiškai nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos. Purškite 2 kartus iš eilės 7–14 dienų intervalu, atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 14 dienų

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Braškės

Miltligė (*Sphaerotheca macularis*)

Norma: 0,2 kg/ha Candit.

Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams prieš žydėjimą ir nuėmus derlių.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 14 dienų

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Agurkai šiltnamiuose

Agurkų miltligė	<i>Sphaerotheca fuliginea</i>
-----------------	-------------------------------

Norma: tirpalo koncentracija 0,02 %.

Candit purškite profilaktiškai ant ką tik išaugusių lapų, 2 kartus iš eilės 7 – 14 dienų intervalu, priklausomai nuo ligos intensyvumo ir veislių jautrumo. Candit gali būti maišomas su kitais fungicidais, naudojamais nuo pilkojo puvinio.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 4 dienos Didžiausias purškimų skaičius - 2

Dekoratyviniai augalai

Rožių miltligė	<i>Sphaerotheca pannosa</i>
Rožių rudoji dėmėtligė	<i>Diplocarpon rosae</i>
Begonijų miltligė	<i>Oidium spp.</i>
Fitoftora	<i>Phytophthora cryptogea</i>
Chrizantemų rūdys	<i>Puccinia horiana</i>
Gvazdikų rūdys	<i>Uromyces dianthi</i>

Norma: tirpalo koncentracija 0,02 %.

Purškite ant ką tik išaugusių lapų.

Nuo chrizantemų rūdžių naudokite 0,1 % koncentracijos tirpalą.

Purškite 3 kartus iš eilės 7 – 14 dienų intervalu. Jautresnėse veislėse ir stipriai plintant ligoms, Candit maišykite su fungicidais, turinčiais kitą veikimo mechanizmą.

Didžiausias purškimų skaičius - 3

Venkite atsparumo!

Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl esama tikimybės, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti preparatų efektyvumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisiimti atsakomybės už nuostolius dėl pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybė gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir preparato naudojimo. Norint išvengti efektyvumo sumažėjimo būtina naudoti tik visą rekomenduojamą BASF preparato normą.

Kad fungicidui CANDIT neišsivystytų ligų atsparumas:

Naudoti fungicidų mišinius;

Nenaudoti fungicido daugiau kaip 3 kartus per vegetaciją.

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis lauko augalams - 400 l/ha, sodams 1000 - 2000 l/ha, serbentams - 1000 l/ha, stikliniuose šiltnamiuose 1000 – 2000 l/ha. Labai svarbu, kad purškiamas tirpalas tolygiai padengtų visus augalus. Aukštuose medžiuose naudokite didžiausias rekomenduojamas vandens normas.

Tirpalo paruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Candit ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Jei tarp purškimų darote ilgą pertrauką, prieš pradėdami purkšti, leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purškite.

Purškimas

Kad purškimas nuo ligų būtų efektyvus, labai svarbu purškiant prisilaikyti techninių reikalavimų. Po purškimo turėtų 1 valandą nelyti.

Saugos priemonės

Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Stenkitės nesukelti dulkių. Nėkvėpuokite išpurkšto tirpalo dulksna. Dirbdami nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Dėvėkite

neperšlampančius, cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius (pagal DIN-EN 465), cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (EN 374), guminius batus, hermetiškai priglundančius apsauginius akinius (EN 166) ir respiratorius nuo skystų ir kietų kenksmingų medžiagų (EN 143 arba 149, tipas P2 arba FFP2). Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.

Sandėliavimas

Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo taroje. Laikant originalioje taroje išlieka efektyvūs 2 metus. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C.

Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas

Nenaudokite taros kitiems tikslams. Neišmeskite likučių ir tuščios taros į aplinką, nes jie yra žalingi gamtai. Neleiskite, kad produkto likučiai patektų į drenažą, kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Tarą gerai ištuštinkite, supilkite likučius į purkštuvo rezervuarą ir išpurškite ant dirbamos žemės. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Pastaba !

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinės dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti preparato efektyvumą. Mes, preparatų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

© BASF registruotas prekės ženklas