

Candit®

FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: krezoksim-metilas 500 g/kg (50 %)
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės (WG)

Lokaliai sisteminio veikimo, strobilurinių grupės fungicidas nuo patogeninių grybų sukeltų ligų, skirtas naudoti obelyse ir kriaušėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, šilauogėse ir spanguolėse, braškėse, auginamose lauke ir šiltnamiuose, rožėse, auginamose lauke ir šiltnamiuose, chrizantemose ir kituose žydinčiuose dekoratyviniuose augaluose, auginamuose šiltnamiuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



PAVOJINGAS

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną vaismedžiams iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112

Avarijos atveju skambinkite bendruoju pagalbos telefonu: 112

Pakuotė: 0,1 kg 0,2 kg, 0,5 kg, 1,0 kg, 2,0 kg

Registracijos numeris: AS2-27F(2019)

Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C

Užregistravo: BASF UAB Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343 Vilnius, Lietuva

Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Veiklioji medžiaga krezoksim-metilas priklauso strobilurinių grupės fungicidams. Krezoksim-metilo veikimas yra lokaliai sisteminis ir translaminarinis, arba dalinai sisteminis. Dėl paviršiaus sisteminio veikimo ir labai gero atsparumo lietuvi, Candit turi gerą ir ilgalaikį apsauginį poveikį nuo ligų. Candit, naudojamas nuo rauplių soduose, turi apsauginį ir gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą. Serbentuose ir dekoratyviniuose augaluose Candit reikia purkšti profilaktiškai.

AUGALAI IR LIGOS

Obelys ir kriaušės,

Obelių rauplės	<i>Venturia inaequalis</i>
Kriaušių rauplės	<i>Venturia pirina</i>
Miltligė	<i>Podosphaera leucotricha</i>

Norma: 0,2 kg/ha Candit.

Nuo rauplių obelių ir kriaušių sodai purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams 2 kartus iš eilės 7-14 dienų intervalu, nuo pumpurų skleidimosi pradžios/žiedinių pumpurų sprogo pradžios iki vaisių brandos pradžios/vaisių nusispalvinimo pradžios (BBCH 53-81).

Nuo miltligės purškite infekcijos pradžioje, kai miltligė pasirodo ant lapų ir ūglių. Laikas nuo vieno purškimo iki kito derinamas atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą.

Norėdami išvengti atsparumo, nenaudokite strobilurinių grupės fungicidų daugiau kaip 2 kartus iš eilės purškimo programoje. Jei atsparumas jau pasireiškė, Candit maišykite su fungicidais, turinčiais kitą veikimo būdą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 28 dienos

Didžiausias purškimų skaičius - 2

Raudonieji ir juodieji serbentai, šilauogės, spanguolės

Miltligė	<i>Sphaerotheca mors-uvae/Podosphaera mors-uvae,</i> <i>Mycosphaerella spp.</i>
----------	--

Norma: 0,2 kg/ha Candit.

Purškama profilaktiškai nuo pumpurų skleidimosi pradžios/išbrinkus žydėjimo pumpurams iki pirmosios uogos ant skrotelės pagrindo įgyja veislei būdingą spalvą (BBCH 51-85). Purškite 2 kartus iš eilės 7-14 dienų intervalu, atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 14 dienų

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Braškės lauke ir šiltnamiuose

Miltligė	<i>Sphaerotheca macularis</i>
----------	-------------------------------

Norma: -0,2 kg/ha Candit.

Purškama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams nuo laikotarpio, kai išsiskleidžia pirmasis lapas iki antro derliaus vaisių nusispalvinimo būdinga spalva (BBCH 11-89).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 7 dienos

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Rožės lauke

Rožių miltligė	<i>Sphaerotheca pannosa</i>
Rožių rudoji dėmėtligė	<i>Diplocarpon rosae</i>

Mažos apimties naudojimas:

Rožės, chrizantemos, dekoratyviniai žydintys augalai šiltnamiuose:

Rožių miltligė	<i>Sphaerotheca pannosa</i>
Rožių rudoji dėmėtligė	<i>Diplocarpon rosae</i>
Chrizantemų rūdys	<i>Puccinia horiana</i>
Gvazdikų rūdys	<i>Uromyces dianthi</i>
Begonijų miltligė	<i>Oidium spp.</i>
Fitoftora	<i>Phytophthora cryptogea</i>

Candit naudojimas mažais plotais auginamiems augalams išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Norma: 0,06-0,2 kg/ha

Purškite ant ką tik išaugusių lapų nuo kai išsiskleidžia pirmasis lapas ir sėklų brandos pabaigos (BBCH 11-89).

Purškite 2 kartus su 7 – 14 dienų intervalu. Jautresnėse veislėse ir stipriai plintant ligoms, Candit maišykite su fungicidais, turinčiais kitą veikimo būdą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – be apribojimų

Didžiausias purškimų skaičius – 2

DĖMESIO!

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis lauko augalams nuo 150 iki 1000 litrų vandens 1 hektarui. Šiltnamio augalams – 1000 litrų 1 hektarui. Labai svarbu, kad purškiamas tirpalas tolygiai padengtų visus augalus. Aukštiesiems medžiams purkšti naudokite didžiausias rekomenduojamas vandens normas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais produktais, kreipkitės į produktų gamintojus.

Tirpalo paruošimas

½ arba ¾ purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Candit ir baikite pilti vandenį. Candit berkite lėtai, leiskite produktui gerai ištirpti. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Įsitikinkite, kad augalų lapų paviršius gerai padengtas tirpalu.

Aukštesniems medžiams naudokite daugiau vandens. Jei tarp purškimų darote ilgą pertrauką, prieš pradėdami purkšti, leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purškite.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Laikotarpis be lietaus

Po purškimo turėtų 1 valandą nelyti.

Venkite atsparumo!

Veiklioji medžiaga krezoksim-metilas priklauso strobilurinių grupės fungicidams (strobilurinių cheminė klasė, QoI grupė) FRAC Kodas C3, kuris turi didelę atsparumo atsiradimo riziką. Obelyse yra rasta atsparių rauplių *Venturia inaequalis* padermių.

Veikliosios medžiagos su tuo pačiu veikimo būdu pakartotinas naudojimas gali padidinti atsparumo išsivystymo riziką. Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, rekomenduojama produktą naudoti mišiniuose arba pakaitomis su produktais, veiksmingais nuo esamų ligų ir turinčiais skirtingą veikimo pobūdį nei Candit. Maišomas produktas, ar produktas kurį naudosite pakaitomis, neturėtų priklausyti tai pačiai FRAC pesticidų grupei kaip ir Candit, taip pat neturėtų priklausyti QoI grupės fungicidams.

Atsparumo rizika gali būti sumažinta, jei produktus naudosite proflaktiškai arba infekcijos pradžioje.

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba kreipkitės į produktų gamintojus, dėl naujausios informacijos.

Sandėliavimas

Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo pakuotėje. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C.

Saugos priemonės

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko, sodo ar nugariniais purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia

kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Pirmoji pagalba

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Atsakomybė!

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.