

Cedomon

Biologinis preparatas sėklų apdorojimui

Veiklioji medžiaga: *Pseudomonas chlororaphis* MA 342 (120 g/kg)

Emulsija sėklų apdorojimui.

Cedomon - aliejinio pagrindo biologinis sėklų apdorojimo produktas skirtas vasarinių miežių ir avižų sėklų apdorojimui siekiant sunaikinti sėklos viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus.

Skirtas profesionaliam naudojimui sėklų ruošimo įmonėse.



KENKSMINGAS

Dėmesio!

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius darbužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus būtina augalų apsaugos produktą įterpti į dirvą, ypač užtikrinant visišką įterpimą lauko gale.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu at jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

**PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS, KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.**

Pakuotė: 25 l, 200 l, 1000 l.

Gamintojas:

BioAgri AB
P.O. Box 914
SE-751 09 Uppsala
Švedija

Produkto importuotojas ir platintojas:

UAB NUTRILITA
Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai
Tel./fax.: 8 41 595524

Registracijos Nr.0321B/07
Siuntos Nr.
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas: Laikant +4 - +8°C
temperatūroje - 1 mėnuo

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo ir veikimo spektras

Naudojamas sėklų apdorojimui sėklų apdorojimo mechanizmuose prieš vasarinių miežių ir avižų sėklų patogenus.

Vasariniai miežiai

Norma: 7,5 l/t

Tinkliškoji dryžligė (*Pyrenophora teres*)

Juostuotoji dryžligė (*Pyrenophora graminea*)

Fuzarioziniai puviniai (*Fusarium* spp.)

Avižos

Norma: 7,5 l/t

Fuzarioziniai puviniai (*Fusarium* spp.)

Dozavimas

7,5 litrai/tonai (Vandens papildomai nereikia)

Veikimo būdas

Produktas susideda iš dažnai sutinkamos dirvos bakterijos (10^9 - 10^{10} CFU/ml) *Pseudomonas chlororaphis* (izoliuotas MA 342). Produktas yra specifiskai skirtas javų sėklų apdorojimui. Dygimo, augimo metu bakterija dauginasi ant sėklų, daigų ir augalų iki penkių lapų stadijos ir todėl pasiekama ilgalaikė apsauga.

Pastaba: Jei sėkla gerai išvalyta, Cedomon tolygiai padengia grūdą ir prilimpa prie jo paviršiaus. Apdorota sėkla gali būti sandėliuojama ne ilgiau kaip metus laiko. Paketai su apdorotomis sėklomis turi būti pažymėti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Negalima apdoroti sudygusios, nešvarios, suskilusios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip pažeistos sėklos. Cedomon neturėtų būti naudojamas prieš kitas ligas ir nedidesnėmis dozėmis, nei rekomenduojama. Rekomenduojame apdoroti tiek sėklos, kiek ruošiatės sėti.

Sėklų apdorojimas

Cedomon gali būti naudojamas paprastomis sėklų beicavimo mašinomis. Beicuotuvai turi būti gerai išplautas karštu vandeniu su dezinfekavimo priemone. Prieš pradėdant sėklų apdorojimą mašina turi būti sukalinuota. Cedomon prieš pilant į maišytuvą turi būti gerai suplaktas, o maišytuvai turi būti įjungtas viso apdorojimo proceso metu. Cedomon gali būti naudojamas temperatūroje ne žemesnėje nei +1°C.

Saugos priemonės:

Produktas yra nekenksmingas aplinkai. Nutekėjimo atveju surinkite produktą naudodami absorbuojančią medžiagą ir sunaikinkite laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Tuščia tarą uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Nenaudoti tuščių įpakavimų kitiems tikslams.

Sėklų apdorojimo įrangos valymas

Po panaudojimo mašina turi būti išskalauta karštu vandeniu ir valymo priemone. Po plovimo nutekėjęs vanduo aplinkai yra nekenksmingas. Su vandens srautu, kuriame yra kitų pesticidų, ne Cedomon, liekanų turėtų būti elgiamasi kaip nurodyta šių konkrečių pesticidų nurodytose saugos priemonėse.

Laikymas:

Laikyti originalioje, gerai uždarytoje pakuotėje, +4 °C - +8 °C temperatūroje neilgiau nei du mėnesius. Produktas turi būti naudojamas iki galiojimo laiko pasibaigimo datos užrašytos ant atskiros statinės ar konteinerio. Apdorotos sėklos neturi būti sandėliuojamos ilgiau nei vienus metus nuo apdoravimo iki panaudojimo. Laikyti vaikams ir pašaliniam nepasiekiamame vietoje, atskirai nuo maisto produktų, toliau nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių.

Pirmoji pagalba:

Patekus į akis ar užtiškus ant odos nuplauti vandeniu. Prireikus kreipkitės į gydytoją.

Garantiniai reikalavimai:

Cedomon kokybė yra garantuojama jei produktas įgyjamas uždarytame originaliame konteineryje. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl nuostolių patirtų neteisingai laikant ar naudojant produktą.