

CHAMPION® 50 WP

Čempionas 50% š.m.

Veiklioji medžiaga: vario hidroksidas 77% (50% metalinio vario ekvivalento)

Šlampaštys milteliai

Naudojimo spektras: Naudojamas profilaktiškai apsaugoti bulves ir vaismedžius nuo grybinių ligų. Preparatas skirtas individualiam naudojimui.



KENKSMINGAS



PAVOJINGAS APLINKAI

DĖMESIO!

Kenksmingas prarijus.

Dirgina akis.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Registracijos Nr.0262F/04

Partijos Nr. žiūrėti ant įpakavimo.

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.

Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

Gamintojas: NUFARM UK LIMITED

Crabtree Manorway North

Belvedere Kent DA 176 BQ

Anglija

Registracijos savininkas: NUFARM UK LTD.

Importuotojas ir fasuotojas Lietuvoje:

UAB „Litagros chemija“

Savanorių pr. 173,

LT-03150 Vilnius

Tel.: +370 5 236 16 93

Fax.: +370 5 236 16 95



Pakuotė: **25 g; 50 g**

Prieš naudojimą atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją!

**SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATOS IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS**

NAUDOJIMO BŪDAI IR NORMOS

1. Saugant bulves nuo maro ir sausligės.

Rekomenduojama norma: 63 g preparato 10 l vandens. (Vienam arui bulvių nupurkšti reikia 25 g preparato - 4 l tirpalo). Jei augalų lapija labai vešli, vandens naudoti daugiau. **Purkšti galima daugiausiai 4 kartus.**

Purškimo laikas: pradėti purkšti, jei oro sąlygos palankios plisti grybinei infekcijai, sukeliančiai bulvių marą, tačiau ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Vieną kartą nupurškus preparatu ČEMPIONAS 50% š.m. arba kitais sisteminio veikimo preparatais, vėliau juos galima naudoti pakaitomis su fungicidais, priklausančioms kitoms cheminėms grupėms.

2. Saugant obelis nuo rauplių.

Rekomenduojama norma: 50 g preparato 10 l vandens. Tirpalo koncentracija – 0,5%. **Purškimo laikas:** ankstyvasis sodų purškimas iki vegetacijos pradžios prieš pumpurų brinkimą. **Purkšti galima tik vieną kartą.**

KARENCIJA

Nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo turi praeiti 7 dienos.

Pastaba: Rekomenduojama 5 metrų apsauginė zona paviršinio vandens telkiniams apsaugoti, kai purškiamos bulvės, ir 10 metrų apsauginė zona, kai purškiamos obelys, jei nėra numatyti kitokie apsaugos atstumai pagal Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisykles.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Specialiame inde preparatą išmaišyti su trupučiu vandens. Į purkštuvą su puse kiekio vandens pilti gautą suspensiją. Po to supilti likusį vandenį. **Tuščią tarą sunaikinti laikantis nustatytų reikalavimų.**

SAUGOJIMAS

Laikyti preparatą sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, gerai vėdinamose patalpose atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, toliau nuo šildytuvų bei atviros ugnies.

Optimali laikymo temperatūra 0°C-30°C.

Saugoti, kad preparatas nepatektų į vandens telkinius.

RUOŠIANT TIRPALĄ

Neatskiestas preparatas dirgina akis.

Būkite su apsauginiais akiniais.

Mūvėkite gumines pirtines.

Dėvėkite respiratorių.

Patekus preparato į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite jį švariu vandeniu.

Suterštus drabužius nusirenkite ir išskalbkite.

DIRBANT SU TIRPALU

Purškimo metu venkite kontakto su preparatu.

Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite.

PO DARBO SU PREPARATU

Po darbo purškimo įrengimus rūpestingai išplaukite.

Nusiprauskite, persirenkite ir išskalbkite suterštus drabužius.

Išvalykite individualios saugos priemones.

Preparatą saugokite sandariai uždarytą gamyklos taroje atskirai maisto produktų, laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Tuščią tarą būtinai sunaikinkite laikydamiesi nustatytų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus į akis, skubiai nuplaukite jas vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Prarijus, gerkite daug pieno arba daug vandens. Kreipkitės į gydytoją. Negalima gerti alkoholio.

Pastaba gydytojui: jeigu yra pažeista gleivinė, skrandžio plauti nepatartina.

Įkvėpus, nukentėjusį išneškite į gryną orą. Sutrikus kvėpavimui, skubiai atlikite dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos, gerai nuplaukite ją vandeniu su muilu. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

Priešnuodžių nėra. Taikyti simptominių gydymą.