



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *ELATUS PLUS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2017 m. rugpjūčio 9 d. Nr. A1-451
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Elatius Plus* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju fungicidą *Elatius Plus*, Syngenta Polska Sp. z o.o., profesionaliajam naudojimui iki 2024 m. kovo 2 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: benzovindiflupiras 100 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Kenksminga prarijus.

Kenksminga įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,375–0,75 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,375–0,75 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, ramuliarijos.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,375–0,75 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.

Žieminiam rugiams.

Norma: 0,375–0,75 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas