

Bulvių vėžių vadinama liga, kurią sukelia mikroskopinis grybas bulvinis raupis (lot. *Synchytrium endobioticum* (Schilb.)).

AUGALAI ŠEIMININKAI

Valgomoji bulvė – *Solanum tuberosum*.



PAPLITIMAS

Ligos sukėlėjas aptinkamas visur, kur auginamos bulvės – Azijoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje.

Lietuvoje, 2000 m. nutraukus senų židinių kontrolę ši pavojinga bulvių liga daugiau nebuvo aptikta.

Infekcijos šaltinis

1. Užkręsta bulvių sėkla.
2. Netolimais atstumais, iš vieno sklypo į kitą, grybo sporos gali būti perneštos su žemės ūkio technika, įrankiais.

LIGOS POŽYMAI

Bulvinį raupį galima aptikti rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais. Ant bulvių stiebagumbių, stolonų, o lietingais metais ir ant apatinės stiebo dalies randami netaisyklingos formos, žiedinio kopūsto galvutę primenantys įvairaus dydžio augliai.

Iš pradžių auglys būna šviesus, vėliau tamsėja – gelsta, paruduoja ir pagaliau beveik pajuosta. Žemės

paviršiuje ant stiebo auglys būna purvinai žalios spalvos. Tikrosios šaknys niekada neužsikrečia.

Kai augliai formuojasi ant sandėlyje esančių gumbų, jie yra tokios pat spalvos kaip stiebagumbio odelė, bet per laiką patamsėja. Jei yra pakankama šviesos, pažaliuoja.

GRYBO BIOLOGIJA

Bulvinio raupio vystymosi ciklas gana sudėtingas. Grybas yra mikroskopinis, gyvena kaip parazitas bulvių ląstelėse. Parazitiniams grybams prasiskverbus į augalo audinius, ant stiebagumbių pradeda formotis išaugos. Pažeistoje augalo vietoje grybas dauginasi ir iš augalo audinių susiformuoja vėžiniai augliai. Augliai gali būti labai įvairaus dydžio: nuo mažo žirnelio iki bulvės stiebagumbio dydžio. Išoriškai jie



Archiv VŪB HB, e-dėlini ochrany

primena žiedinio kopūsto žiedyną. Pradžioje augliai būna balti, o sendami tampa tamsiai rudos spalvos. Kai bulvinio raupio sporų prisipildę augliai supūva ir subyra, į dirvą patenka geltonai rudos storasienės grybo sporangės. Būdamos ramybės būklės sporos

dirvožemyje gyvybingos gali išlikti net 20–30 metų.

Pavasari temperatūrai pakilus iki 10–20 °C ir esant tinkamam augalui šeimininkui, žiemojusios sporangės sudygs, ir grybas pradeda naują savo vystymosi ciklą.

EKONOMINĖ ŽALA

Užkrėstame dirvožemyje bulvių kerai neišaugina sveikų stiebagumbių, o užsikrėtę stiebagumbiai blogai laikosi sandėliuose, greitai pūva, praranda prekinę išvaizdą.

Užkrėstame lauke ilgą laiką (20 metų) draudžiama auginti bulves ir persodinti skirtus augalus, todėl sumažėja laukų plotai, tinkami bulvėms ir kai kurioms kitoms kultūroms auginti.

PREVENCIJA

Jei pastebėjote ligos požymių, prašome nedelsiant pranešti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Tokiu atveju bus imami bulvių stiebagumbių bei dirvožemio mėginiai tyrimams Tarnybos laboratorijoje.



APSAUGOS PRIEMONĖS

Jei įtarimas dėl ligos pasitvirtina, taikomos fitosanitarinės priemonės.

Užkręsti stiebagumbiai ir augalų liekanos užkasamos duobėje užpilant 1,0 m storio žemių sluoksniu. Užkręstiems stiebagumbiams naikinti naudotas darbo priemones būtina dezinfekuoti.

Prekyba užkręstomis bulvėmis griežtai draudžiama.

Aplinkui užkręstą plotą nustatoma saugos zona (300 m pločio juosta).

Nustatytoje saugos zonoje leidžiama auginti tik skirtas perdirbti ir konkrečiam grybo patotipui atsparias bulvių veisles.

Užkręstame lauke draudžiama auginti bulves ir augalus, kurie skirti persodinti į kitus laukus.

Turi būti taikoma sėjomaina (kukurūzai, kviečiai, žirniai ir kt.), visą draudimo laikotarpį dirva užkręstame plote turi būti dirbama nepaverčiant jos nuolatine ganykla.

Baigus darbus, visa užkręstame plote naudota technika turi būti dezinfekuojama.

Žemės sklype, kuriame buvo aptiktas *S. endobioticum*, bulves sodinti leidžiama ne anksčiau kaip po 20 metų, jei atlikus fitosanitarinį tikrinimą iširtame dirvožemio mėginyje nerandama gyvybingų grybo sporų.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į:

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS REGIONINIUS SKYRIUS:

Alytaus – Vilniaus g. 21, Alytus,
tel.(8~315) 561 12;

Kauno – Donelaičio g. 33, 504 kab., Kaunas,
tel. (8~37) 32 06 32;

Klaipėdos – Sankryžos g. 7, Klaipėda,
tel. (8~46) 36 54 53;

Marijampolės – Kauno g. 142-2, Marijampolė,
tel. (8~343) 974 50, 970 94;

Panevėžio – Anykščių g. 4, Panevėžys,
tel. (8~45) 46 23 75;

Šiaulių – A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai,
tel. (8~41) 430 743;

Tauragės – Bažnyčių g. 14, Tauragė,
tel. (8~446) 610 68, 612 20;

Telšių – Žalioji g. 10, Telšiai,
tel. (8~444) 31 082, 31 084;

Utenos – Maironio g. 1, Utena,
tel. (8~398) 614 65, 522 33;

Vilniaus – Smėlio g. 8, Vilnius,
tel. (8~5) 238 39 70, 238 39 71.

FITOSANITARIJOS SKYRIŲ

Kalvarijų g. 62, Vilnius
tel.: (8 5) 273 1311, (8 5) 273 4411
el. paštas info@vatzum.lt
Interneto svetainė <http://www.vatzum.lt>

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
tel. (8 5) 237 5631
Pasitikėjimo linija (8 5) 270 80 80
Interneto svetainė <http://www.vatzum.lt>
el. paštas info@vatzum.lt



VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS



**BULVINIS RAUPIS –
BULVIŲ VĖŽIO SUKĖLĖJAS**
(*Synchytrium endobioticum* (Schilb.))

2017 m.
VILNIUS