

Glyphomax®

Glifomaksas 360 g/l

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: **glifosatas 360 g/l**
Preparato forma: **vandeninis tirpalas**

Glyphomax® - sisteminis herbicidas skirtas daugiamečių ir vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš ir po derliaus nuėmimo varpinių javų pasėliuose, pūdymuose, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose bei vaismedžių pomedžiuose. Taip pat naudojamas ne žemės ūkio paskirties plotuose.

Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui.



APLINKAI PAVOJINGAS DĖMESIO !

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)/

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTI PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI GALIMOS RIZIKOS PAKENKTI APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS

Pakuotė: 10 L, 20 L

Registracijos Nr.: 0199H/06

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Gamintojas:

Dow AgroSciences SA
BP 20, Zone Industrielle
F-67410 Drusenheim-FRANCE

Registracijos savininkas:

Dow AgroSciences Denmark A/S,
Sorgenfrivej 15, DK-2800
Kgs Lyngby – DENMARK

Importuotojas:

Berner OY
Eteläranta 4,P.O.15
FI-00131 Helsinki, Suomija

Berner/Dow AgroSciences atstovas Lietuvoje:

Jonalaukio km., Ruklos sen.,
Jonavos raj. LT- 55296
Tel./faks.: 8-349-56248
El.p.: dowagro@berner-lit.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Glyphomax[®] - sisteminis herbicidas skirtas daugiamečių ir vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš ir po derliaus nuėmimo varpinių javų pasėliuose, pūdymuose, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose bei vaismedžių pomedžiuose. Taip pat naudojamas ne žemės ūkio paskirties plotuose. Preparato veiklioji medžiaga – glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias jo dalis, aktyvios vegetacijos metu. Glyphomax[®] poveikis piktžolėms pastebimas po 7-10 dienų, o visiškai jos sunyksta per 2-3 savaites.

NAUDOJIMO LAIKAS

Glyphomax[®] efektyviausiai veikia piktžoles turinčias vešlių lapiją (pvz., varputis turi turėti ne mažiau kaip 3-4 lapus). Lietus Glyphomax[®] gali nuo lapų nuplauti, todėl purkšti reikia ne mažiau 4 valandos prieš lietų. Glyphomax[®] geriausiai veikia, kai oro temperatūra yra +10°C -+20°C šilumos ir pakanka drėgmės.

NAUDOJIMO NORMOS

APDOROJAMI AUGALAI	NAUDOJIMO NORMA (l/ha)	APDOROJIMO LAIKAS
VARPINIAI JAVAI	3,0	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%. Tai atitinka pilnos vaškinės brandos stadiją. Praktiškai tai yra tada, kai spaudžiant nykščio nagu ant grūdo lieka žymė. Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose.
ŽIRNIAI	2,0	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiames vienaskiltes.
ŽIRNIAI	4,0	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams. Purkšti vegetuojančias daugiames vienaskiltės ir dviskiltes piktžoles.
LINAI	3,0	Purškama kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Paskutinis terminas iki derliaus nuėmimo 10 dienų. Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiames vienaskiltes.
LINAI	4,0	Purškama kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Paskutinis terminas iki derliaus nuėmimo 10 dienų. Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Purkšti vegetuojančias daugiames vienaskiltės ir dviskiltes piktžoles.
ŽIEMINIAI IR VASARINIAI RAPSAI	3,0	Purškama, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Paskutinis terminas iki derliaus nuėmimo 10 dienų. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiames vienaskiltes.
ŽIEMINIAI IR VASARINIAI RAPSAI	4,0	Purškama, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Paskutinis terminas iki derliaus nuėmimo 10 dienų. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Purkšti vegetuojančias daugiames vienaskiltės ir dviskiltes piktžoles.
PŪDYMAI	2,0 - 4,0	Purškiamos vegetuojančias piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti praėjus 10 dienų po purškimo. Jeigu vyrauja daugiames vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (usnys, pienės ir kitos) rekomenduojame naudoti didesnę preparato normą.

LAUKAI PO DERLIAUS NUĖMIMO	3,0	Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Purkšti kai varpučiai turi 3-6 lapelius. Purkšti Glyphomax® galima iki vėlyvo rudens. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
LAUKAI PO DERLIAUS NUĖMIMO	4,0	Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Purkšti kai varpučiai turi 3-6 lapelius. Purkšti Glyphomax® galima iki vėlyvo rudens. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
VAISMEDŽIŲ POMEDŽIAI	2,0	Purškiamos vegetuojančios vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Pastaba: nenaudoti 1-2 metų jaunuose soduose be specialios kamienų apsaugos.
VAISMEDŽIŲ POMEDŽIAI	4,0	Purškiamos vegetuojančios daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Pastaba: nenaudoti 1-2 metų jaunuose soduose be specialios kamienų apsaugos.
NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES PLOTAI	3,0	Elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai. Purškiamos vegetuojančios vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės.
NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES PLOTAI	6,0	Elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai. Purškiamos vegetuojančios daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės.

PURŠKIMO TECHNIKA

Glyphomax® kokybiškai išpurškiamas žemės ūkyje naudojamais įvairiais nugariniais ir traktoriniais štanginiais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais. Kartais gali būti naudojami ir kiti prietaisai - specialūs ežektoriai, aplikatoriai ir t.t. naudojant įprastinius purkštuvus, reikėtų išpurkšti 100-200 l/ha tirpalo (naudojant mažesnes nei 3 l/ha normas - ne daugiau kaip 150 l/ha), nerekomenduojama naudoti daugiau, kaip 50 litrų vandens 1 litrui Glyphomax®. Slėgis turėtų būti 2-3 barai, o važiavimo greitis - 7-8 km/val. Prieš pradėdami purkšti patikrinkite purkštuvo siurblių, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba sugedusias detales. Purkštuvą turi būti techniškai tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalą ruoškite tik švariame, be priemaišų vandenyje. Nepurkšti vėjuotu oru.

PURKŠTUVŲ PLOVIMAS

Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu vandeniu arba specialia priemone, mes rekomenduojame naudoti -All Clear Extra™.

SAUGOS PRIEMONĖS

Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugines priemones. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Baigę darbą, prieš pradėdami valgyti, gerti ar rūkanti, nusiplaukite rankas ir neuždengtas kūno dalis.

SAUGOJIMAS

Glyphomax® turi būti saugomas lakantis augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklių. Laikykite preparatą vėsioje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje. Glyphomax® turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikyti ne žemesnėje kaip -15°C ir ne aukštesnėje +40°C temperatūroje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.

PIRMOJI PAGALBA

Jei pasijaučiate blogai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę.

Patekus ant odos: reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius, o odą nuplauti vandeniu ir muilu. Kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: reikia plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.

Įkvėpus: nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus: neskatinėti vėmimo. Užtikrinkite nukentėjusiajam ramybę. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

PATARIMAI GYDYTOJUI

Specifinio priešnuodžio nėra. Stebėti nukentėjusįjį, gydymas simptominis.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią tarą tris kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant apdoroto ploto, po to ją uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Nenaudoti tuščių ipakavimų kitiems tikslams.

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI

Glyphomax® - Dow AgroSciences, JAV

All Clear Extra™ – E.I. Du Pont de Nemours Co.(Inc),JAV