

Goltix 700 SC naudojimo rekomendacijos špinatams, auginamiems sėklai

Auginant špinatus sėkloms, būtina sąlyga – išlaikyti sėklų kokybę, t. y. 99,9 proc. sėklų švarumą. Reikalaujamai kokybei pasiekti reikalingi efektyvūs herbicidai. Goltix 700 SC, kurio veiklioji medžiaga metamitronas – vienas iš herbicidų, kurį augalai toleruoja, panaudojus prieš sudygimą. Remiantis gerąja Danijos patirtimi, *Goltix 700 SC* naudojamas sėkloms auginamų špinatų pasėliuose iki sudygimo, 1 l/ha norma per auginimo sezoną.

Panaudojimas	Laikas	Veiklioji medžiaga	Produkto pavadinimas	Panaudojimo norma
1	Prieš sudygimą, 1–2 dienos po sėjos	Metamitronas 700 g/l	<i>Goltix 700 SC</i>	0,75–1,0 l/ha

Piktžolės, kurias naikina metamitronas (*Goltix 700 SC*):

- bekvapiai šunramuniai (*Tripleurospermum inodorum*);
- dirviniai garstukai (*Sinapis arvensis*);
- baltosios balandos (*Chenopodium album*);
- plačiosios balandūnės (*Atriplex patula*);
- dirvinės veronikos (*Veronica arvensis*);
- raudonžiedės notrelės (*Lamium purpureum*);
- dirvinės aklės (*Galeopsis tetrahit*);
- juodosios kiauliuogės (*Solanum nigrum*).