

**PREPARATAI NAUDOJAMI SANDĖLIŲ DEZINSEKCIJAI**

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdorojimo būdas	Naudojimo apribojimai
1. <b>Actellic 50 EC (A5862C)</b> Syngenta Crop Protection AG 0106I/11, 2018-09-30	Pirimifos metilas 500 g/l	100 ml/100m <sup>2</sup>	Tušti sandėliai	Miltinės erkės, aruodiniai straubliukai, mažieji milčiai, mažieji grūdiniai skaptukai, aruodinės kandys, amiltiniai, aruodiniai ir malūniniai ugniukai, surinaminiai aruodvabaliai	Tušti sandėliai apdorojami tik automatizuotomis sistemomis, mažiau kaip 15 dienų iki naujo derliaus grūdų sandėliavimo. Sandėlyje galima dirbti ir pilti grūdus tik gerai jį išvėdinus. Vėdinti netrumpiau kaip 1 valandą.	Pastaba: dezinfekciją gali atlikti tik sertifikuotos įmonės su specialia įranga (aerolinė dezinfekcija).
2. <b>Karate Zeon 5 CS</b> Syngenta Crop Protection AG, 0236I/07, 2017-07-31	Lambda-cihalotrinas 50 g/l	0,4 ml/m <sup>2</sup>	Tušti sandėliai	Sandėlių kenkėjai	Apdorojama šlapiu būdu 200 ml tirpalo 1m <sup>2</sup>	Praėjus 72 valandoms po apdorojimo, leidžiama įeiti žmonėms ir pilti grūdus
		0,8 ml/m <sup>2</sup>	Teritorija apie sandėlius	Sandėlių kenkėjai	Apdorojama šlapiu būdu 400 ml tirpalo 1 m <sup>2</sup>	
3. <b>K-Obiol</b> Bayer Crop Science AG 0414I/11 2016-10-31	Deltametrinas 25 g/l	40-60 ml/100m <sup>2</sup> paviršiaus	Tušti sandėliai	Naikina sandėlių kenkėjus: aruodinių (javų) straubliukų, ryžinių straubliukų, mažųjų milčių,	Purkšti tuščius sandėlius 40–60 ml insekticido, 5–10 l vandens / 100 m <sup>2</sup> paviršiaus ne daugiau kaip 1 kartą.	

					mažųjų grūdinių skaptukų, plokščiavabalių (milčių) vabalus ir mažųjų milčių bei kapravabalių lervas.	
		10-20 ml/t grūdų	Žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių ir žieminių rugių grūdai	Naikina sandėlių kenkėjus: aruodinių (javų) straubliukų, ryžinių straubliukų, mažųjų milčių, mažųjų grūdinių skaptukų, plokščiavabalių (milčių) vabalus ir mažųjų milčių bei kapravabalių lervas.	Purkšti 10–20 ml/t insekticido atskiedus 0,5–1,5 l vandens ne daugiau kaip 1 kartą	